

**Comparative Effects of Conventional and Nanoliposomal licorice (*Glycyrrhiza glabra*) Extract Supplementation on Rumen Fermentation Parameters under Experimentally Induced Acidosis in vitro**

**Milad Maghsoudi Parsa<sup>1</sup>, Ghader Jalilzadeh<sup>2\*</sup>, Bahram Dalir-Naghadeh<sup>3</sup>, Ehsan Anasori<sup>4</sup>, Behzad Asadnezhad<sup>5</sup>, Masoud Ahmadjad<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Department of Internal Medicine and Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.

<sup>5</sup> Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

<sup>6</sup> Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University, Kermanshah, Iran.

Article Info	ABSTRACT
<b>Article type:</b> Research Full Paper	<b>Background and Objective:</b> Rumen acidosis is one of the most important nutritional disorders in ruminants, characterized by a decline in ruminal pH, epithelial damage, disruption of fermentative pathways, reduced nutrient absorption, and an increase in methane emissions. Subacute ruminal acidosis (SARA) is highly prevalent in dairy and feedlot cattle and results in significant economic losses due to reduced milk yield, poor growth performance, veterinary costs, and energy lost through inefficient fermentation. With increasing restrictions on the use of antibiotic feed additives, plant-based additives such as <i>Glycyrrhiza glabra</i> (licorice) have gained attention due to their antimicrobial, anti-inflammatory, and fermentation-modulating properties. However, many plant extracts have limitations such as low solubility, instability, and poor bioavailability. Nanoliposome technology offers a promising strategy to improve stability, controlled release, and bioefficacy of bioactive compounds. This study aimed to evaluate the effects of free and nanoliposome-encapsulated licorice extract on ruminal fermentation parameters, methane production, protozoal population, and pH stabilization under normal and acidosis-induced conditions.
<b>Article history:</b> Received: Revised: Accepted:	
<b>Keywords:</b> Rumen acidosis Nanoliposome Methane Licorice cattle	<b>Materials and Methods:</b> This in vitro study was conducted using rumen fluid collected from fistulated Holstein bulls. Nanoliposomes were synthesized via thin-film hydration and loaded with standardized commercial licorice extract containing 19–24% glycyrrhizin. The basal diet with a forage-to-concentrate ratio of 70:30 was used, with three treatments: basal diet alone, basal diet plus free licorice extract, and basal diet plus nanoliposome-encapsulated extract. Buffered rumen fluid was incubated at 39 °C under continuous CO <sub>2</sub> . Gas production was recorded at multiple intervals up to 120 h. After 24 h of incubation, ruminal pH, protozoal counts, volatile fatty acids (VFA), methane production, digestibility, fermentable organic matter, and metabolizable energy were measured. An acidosis challenge test was performed by adding dextrose to induce rapid fermentation. Data were analyzed using the mixed model procedure of SAS and Tukey's test for mean

---

---

comparison.

**Findings:** Nanoliposomes exhibited a uniform spherical morphology with a hydrodynamic diameter of 122.2 nm and a low PDI (0.013), indicating high stability and homogeneity. Both free and nanoliposome licorice extract reduced lag time and increased early-stage fermentation rate, while decreasing gas production during late fermentation (48–120 h). Treatments increased butyrate concentration while decreasing acetate and propionate, resulting in a lower total VFA concentration and reduced methane production. The nanoliposome treatment caused a greater reduction in protozoal population compared with free extract and maintained a significantly higher ruminal pH, particularly under acidosis-induced conditions. Ammonia-nitrogen concentrations and substrate degradability remained within optimal ranges, indicating no adverse effects on overall microbial activity. In the acidosis challenge, nanoliposome licorice extract more effectively prevented severe pH decline and showed superior buffering and stabilization capacity, while supporting adequate microbial fermentation.

**Conclusion:** Encapsulation of licorice extract in nanoliposomes enhanced its functionality in modulating rumen fermentation, reducing methane emission, lowering protozoal counts, and maintaining ruminal pH during acidosis. Controlled release and improved stability of the encapsulated extract provided more sustained biological effects compared with the free form. These findings suggest that nanoliposome-encapsulated licorice extract can serve as an effective natural additive for mitigating SARA, improving nutrient utilization, enhancing environmental sustainability, and potentially reducing reliance on antibiotic feed additives in ruminant nutrition.

---

**Cite this article:** Maghsoudi Parsa, M., Jalilzadeh, Gh., Dalir-Naghadeh, B., Anasori, E., Asadnezhad, B., Ahmadjad, M. (2026). Comparative Effects of Conventional and Nanoliposomal licorice (*Glycyrrhiza glabra*) Extract Supplementation on Rumen Fermentation Parameters under Experimentally Induced Acidosis in vitro. *Journal of Ruminant Research*, 14(2),

---



© The Author(s)



Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

---

## بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن عصاره معمولی و نانولیپوزومال شیرین بیان (*Glycyrrhiza glabra*) بر فراسنجه‌های شکمبه ای در شرایط القای اسیدوز آزمایشگاهی

میلاد مقصودی پارسا<sup>۱</sup>، قادر جلیل‌زاده<sup>۲\*</sup>، بهرام دلیرنقده<sup>۳</sup>، احسان عناصری<sup>۴</sup>، بهزاد اسدنژاد<sup>۵</sup>، مسعود احمدنژاد<sup>۶</sup> به ترتیب دانشجوی دوره دکتری تخصصی داخلی بزرگ، دانشیار، استاد و دانشیار گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه  
<sup>۵</sup> پژوهشگر دوره پسادکترای تغذیه دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  
<sup>۶</sup> استادیار گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله:	سابقه و هدف: اسیدوز شکمبه یکی از اختلالات تغذیه‌ای شایع در نشخوارکنندگان است که با کاهش pH شکمبه، آسیب اپیتلیوم، کاهش عملکرد هضم و جذب مواد مغذی و افزایش تولید متان همراه بوده و پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی ایجاد می‌کند. به‌ویژه اسیدوز تحت حاد (Subacute ruminal acidosis, SARA) در گاوهای شیری و پرواری شایع بوده و موجب کاهش تولید شیر، رشد ضعیف، افزایش هزینه‌های درمان و اتلاف انرژی خوراک می‌شود. استفاده از افزودنی‌های خوراکی گیاهی مانند عصاره شیرین‌بیان ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> ) به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در کنترل SARA مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره خالص و نانولیپوزومال شیرین‌بیان بر شاخص‌های تخمیری شکمبه، پیشگیری از اسیدوز القا شده در شرایط آزمایشگاهی و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بود.
مقاله کامل علمی- پژوهشی	
تاریخ دریافت:	
تاریخ ویرایش:	
تاریخ پذیرش:	
واژه‌های کلیدی:	مواد و روش‌ها: مطالعه به‌صورت آزمایشگاهی روی مایع شکمبه گاوهای نر هشتاین فستوله‌دار انجام شد. نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره شیرین‌بیان با روش هیدراتاسیون لایه نازک سنتز شدند. جیره پایه با نسبت علوفه به کنسانتره ۷۰:۳۰ تنظیم و سه تیمار شامل جیره پایه، جیره به همراه عصاره خالص و جیره به همراه نانولیپوزوم عصاره در نظر گرفته شد. مایع شکمبه با بزاق مصنوعی مخلوط و تحت جریان CO <sub>2</sub> در شرایط ۳۹ سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری (انکوبه) شد. تولید گاز در زمان‌های مختلف، pH، جمعیت پروتوزوا، اسیدهای چرب فرار ( Volatile fatty acids, VFA)، میزان تولید گاز متان، انرژی متابولیسمی و تجزیه‌پذیری خوراک پس از ۲۴ ساعت تعیین شدند. همچنین آزمون اسیدوز القایی با تزریق دکستروز به نمونه‌های شکمبه انجام شد. داده‌ها با مدل‌های مختلط در نرم‌افزار SAS و آزمون توکی تحلیل شدند.
اسیدوز شکمبه	
نانولیپوزوم	
متان	
شیرین بیان	
گاو شیری	

**یافته‌ها:** نانولیپوزوم‌ها دارای ذرات یکنواخت با قطر هیدرودینامیکی ۱۲۲/۲ نانومتر و PDI برابر با ۰/۰۱۳ بودند و SEM اشکال کروی پایدار نشان داد. هر دو تیمار عصاره خالص و نانولیپوزومال موجب کاهش زمان تأخیر تخمیر (Lag time) و افزایش نرخ تولید گاز در ساعات اولیه شدند، درحالی‌که در ساعات دیررس (۴۸ تا ۱۲۰ ساعت) تولید گاز کاهش یافت ( $P < 0/05$ ). استفاده از عصاره‌ها موجب افزایش بوتیرات و کاهش استات و پروپیونات، کاهش کل VFA و کاهش تولید متان شد ( $P < 0/05$ ). جمعیت پروتوزوآها در تیمار نانولیپوزومال کاهش بیشتری نشان داد و pH شکمبه بالاتر از عصاره خالص حفظ شد ( $P < 0/05$ ). همچنین ازت آمونیاکی و تجزیه‌پذیری خوراک در محدوده مطلوب باقی ماند. در شرایط اسیدوز القایی، تیمار نانولیپوزومال توانست pH را در سطح بالاتر حفظ کرده و شدت اسیدوز را کاهش دهد، درحالی‌که تولید گاز همچنان امکان فعالیت میکروبی مطلوب را نشان داد ( $P < 0/05$ ).

**نتیجه‌گیری:** نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره شیرین‌بیان، به‌ویژه در فرم نانولیپوزومال، می‌تواند مسیر تخمیر شکمبه را به سمت الگوی پایدارتر هدایت کرده، تولید گاز و متان را کاهش دهد، جمعیت پروتوزوآ را تعدیل کند و pH شکمبه را در شرایط اسیدوز حفظ نماید. فناوری نانولیپوزوم با افزایش پایداری و رهایش آهسته ترکیبات فعال، اثر طولانی‌مدت و کارآمدتری نسبت به عصاره خالص ارائه می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان ابزار مؤثری در مدیریت اسیدوز تحت حاد و بهبود بهره‌وری تغذیه‌ای و زیست‌محیطی نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

**استناد:** مقصودی پارسا، میلاد؛ جلیل‌زاده، قادر؛ دلیرنقده، بهرام؛ عناصری، احسان؛ اسدزاد، بهزاد؛ احمدنژاد، مسعود. (۱۴۰۵). بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن عصاره معمولی و نانولیپوزومال شیرین‌بیان (*Glycyrrhiza glabra*) بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای در شرایط القای اسیدوز آزمایشگاهی. پژوهش در نشخوارکنندگان، ۱۴(۲).



© نویسندگان



ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

## مقدمه

اسیدوز شکمبه یکی از مهم‌ترین اختلالات تغذیه‌ای نشخوارکنندگان است که با کاهش اشتها، آسیب اپیتلیوم شکمبه، آسسه کبدی، لامینایتیس (لنگش) و پاسخ‌های التهابی همراه بوده و اثرات اقتصادی پنهان (قابل توجه) علاوه بر هزینه بیماری اسیدوز بر دامداری‌ها دارد. تولید بیش از حد اسیدهای آلی در شکمبه، pH را کاهش داده و موجب اختلال در عملکرد و پاراکراتوزیس یا هایپرکراتوزیس پرزهای شکمبه می‌شود که در نهایت با کاهش سطح جذب کارایی هضم و جذب مواد مغذی را کاهش می‌دهد (González و همکاران، ۲۰۱۲؛ Voulgarakis و همکاران 2023a). اسیدوز تحت حاد (SARA) ۱۰ تا ۲۶ درصد از گاوان شیری را در اوایل دوره شیرواری می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد که با توجه به کاهش تولید شیر، درمان، مرگ‌ومیر ناشی از عوارض SARA، رشد ضعیف، حذف اجباری خسارت قابل توجهی بر صنعت دامداری تحمیل می‌کند (Lean و Golder، ۲۰۲۴؛ Streitenberger و همکاران، ۲۰۲۵). اسیدوز حاد بیشتر مواقع تصادفی و تک‌گیر بوده اما SARA در گاوان شیری از لحظه زایش تا ۵ ماه اول و گاوان پرواری را تا لحظه کشتار می‌تواند درگیر کند هزینه این درگیری در آمریکا سالانه ۵۰۰ تا یک میلیارد دلار و ۱/۱۲ دلار به ازای هر رأس در هر روز برای گاوان شیری و ۹/۴ دلار برای کاهش وزن در گاوان پرواری به اضافه ۱۳ دلار برای اتلاف انرژی و جیره برآورد شده است. میزان مرگ‌ومیر ناشی از اسیدوز حاد در گاوان پرواری ۳ درصد تا ۷ درصد بوده است (Voulgarakis و همکاران، ۲۰۲۳a). اسیدوز مزمن یا تحت حاد از نظر اقتصادی جنبه مهم‌تری است که در آن حیوانات ممکن است بیمار به نظر نرسند، اما مصرف خوراک و عملکرد آن‌ها کاهش می‌یابد در نتیجه هزینه پنهان

خواهد داشت. FAO<sup>۱</sup> در سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی کرد که جمعیت جهان تا سال ۲۰۷۵ به ۹/۲ میلیارد نفر می‌رسد. بنابراین، برای تأمین پایدار غذای این جمعیت با فناوری‌های فعلی دشوار خواهد بود؛ بنابراین کشاورزی باید برافزایش بهره‌وری تمرکز بیشتری داشته باشد (Crosson و همکاران، ۲۰۱۱). یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین روش‌هایی که بشر از زمان پیدایش دامپروری متمرکز برای عملکرد بهتر دست‌کاری ترکیبات جیره و افزودنی‌ها بوده است. افزایش نسبت کنسانتره در جیره نشخوارکنندگان یکی از روش‌های رایج برای ارتقای تولید است، اما به دلیل تخمیر سریع نشاسته، احتمال بروز اسیدوز شکمبه‌ای افزایش می‌یابد. در جیره اسیدوزی، تخمیر سریع منجر به کاهش pH و اسیدوز می‌شود. در نتیجه دامپزشکان و مسئولین تغذیه واحدهای دامپروری با افزایش بهره‌وری و تولید واحد با ضررهای اقتصادی بیماری‌های همراه آن (بیماری‌های متابولیکی و بیماری‌های تولید) دچار چالش هستند (Nikkhah و همکاران، ۲۰۲۱). یکی دیگر از روش‌های بهبود عملکرد استفاده افزودنی‌ها خوراکی است در دهه‌های قبل از آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند مونزین، لازالوسید و... جهت تعدیل تخمیر شکمبه و کنترل بیماری اسیدوز تحت حاد شکمبه (SARA) و حتی بهبود دهنده رشد استفاده می‌شد (Simanungkalit و همکاران، ۲۰۲۳). اما بعد از سال ۲۰۰۶ در بسیاری از کشورها استفاده از آن‌ها به دلیل ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تهدید سلامت عمومی ممنوع شد بنابراین محققان دنبال ترکیباتی بودند که علاوه بر خاصیت تعدیل‌کنندگی تخمیر این اثرات سو را نداشته باشد (Benchaar و همکاران، ۲۰۰۸؛ Shakeri و Forozandeh Shahraki، 2025؛ Benchaar و Greathead، ۲۰۱۱؛ Voulgarakis و همکاران، ۲۰۲۳b). افزودنی‌هایی مانند شیرین بیان

<sup>1</sup> Food and Agriculture Organization

پایداری، بهبود انحلال‌پذیری و کنترل رهایش ترکیبات گیاهی، راهکاری مؤثر برای رفع محدودیت‌های سیستم‌های سنتی دارورسانی ارائه می‌کنند. استفاده از لیپوزوم‌ها موجب افزایش حلالیت، پایداری و فراهمی زیستی ترکیبات شده و امکان دارورسانی هدفمند به بافت‌های موردنظر را فراهم می‌سازد (Chen و همکاران، ۲۰۲۴؛ Mujawar و Sankpal، ۲۰۲۵). علی‌رغم مطالعات متعدد در زمینه عصاره‌ها در جیره و گونه‌های متفاوت استفاده از فناوری نانو گزارش نشده است. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر عصاره معمولی و نانولیپوزومال شیرین بیان بر فراسنجه‌های شکمبه گاو در شرایط القای اسیدوز آزمایشگاهی می‌باشد. ارزیابی تاثیر نانولیپوزوم کردن عصاره شیرین بیان بر مقدار و سرعت اثر بخشی عصاره در شرایط القا شده اسیدوز تحت حاد شکمبه (SARA) در آزمایشگاه و نیز کارکردهای زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری ناشی از عصاره شیرین بیان از اهداف مطالعه حاضر می‌باشد.

### مواد و روش‌ها

این مطالعه در فارم تحقیقاتی و آزمایشگاه علوم تغذیه دام گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه انجام شد. نانولیپوزوم حاوی عصاره از شرکت گنجین دانش حامی با استانداردسازی وجود ۱۹ تا ۲۴ درصد گلیسرین تهیه شد و نانولیپوزوم‌ها با روش هیدراتاسیون لایه نازک سنتز شدند. عصاره ریشه شیرین بیان تجاری (تولیدشده در شرکت شیرین بیان زاگرس) با استانداردسازی وجود ۱۹ تا ۲۴ درصد گلیسرین استفاده شده است. جیره پایه با نسبت علوفه به کنسانتره ۷۰:۳۰ برای گاوهای پرواری تنظیم شد این نسبت برای ایجاد یک مدل آزمایشگاهی اسیدوز با درجه متوسط انتخاب شده و لزوماً نماینده جیره معمول گاو شیری پرتولید نیست و تیمارها

(*Glycyrrhiza glabra*) با ترکیباتی مانند گلیسریریزین، ساپونین‌ها و ایزوفلاون‌ها، می‌توانند تخمیر را تعدیل کنند، تولید متان را کاهش دهند. اسیدوز شکمبه با کاهش pH و افزایش LPS باعث التهاب شکمبه هم می‌شود که شیرین بیان با خواص ضدالتهابی و ضد میکروبی، می‌تواند این شرایط را تعدیل کند (Crosson و همکاران، ۲۰۱۱؛ El-Saber Batiha و همکاران، ۲۰۲۰؛ Hasan و همکاران، ۲۰۲۱؛ Murray، ۲۰۲۰). پیش‌بینی شده میانگین دمای کره زمین تا سال ۲۱۰۰ حدود ۱/۸ تا ۳/۹ سانتی‌گراد افزایش پیدا می‌کند (Prasad و همکاران، ۲۰۱۵). همچنین از افزودنی‌های خوراکی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای (GHG) تخمیر شکمبه بهره گرفته می‌شود. یک گاو سالانه به‌طور متوسط ۷۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم متان تولید می‌کند (Swain و همکاران، ۲۰۱۶). تولید متان در شکمبه همانند سینک عمل می‌کند و به طوری که برای تولید ۴/۵ گرم متان حدود ۱۰۰ گرم کربوهیدرات اتلاف می‌شود. کاهش تولید متان علاوه بر استراتژی جلوگیری از گرمایش جهانی در عین حال موجب کاهش اتلاف انرژی و بهبود کارایی استفاده از مواد مغذی در نشخوارکنندگان می‌شود (Patra، ۲۰۱۱؛ Yu، Patra و Reddy، ۲۰۱۲؛ Hyder، ۲۰۲۳). با وجود نقش گسترده گیاهان دارویی و مشتقات آن‌ها در تولید داروهای مؤثر، بسیاری از این ترکیبات با محدودیت‌هایی همچون حلالیت کم در محیط‌های آبی، ناپایداری شیمیایی، فراهمی زیستی ناکافی، توزیع غیراختصاصی در بافت‌ها، بروز عوارض به دلیل سمیت ناخواسته، تخریب سریع در دستگاه گوارش و دسترسی زیستی پایین روبه‌رو هستند (Cheng و همکاران، ۲۰۲۲؛ Sogut و همکاران، ۲۰۲۱). نانولیپوزوم‌ها به‌عنوان یکی از کارآمدترین فناوری‌های نوین دارورسانی، با افزایش

<sup>1</sup> hydrogen sink

شامل جیره پایه، جیره پایه به همراه ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر عصاره شیرین بیان خالص و جیره پایه به همراه ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر عصاره نانولیپوزومال بودند. برای تهیه مایع شکمبه، مایع شکمبه‌ها از سه رأس گاو نر هلستاین فیستوله‌دار پیش از وعده صبح جمع‌آوری و در فلاسک حاوی CO<sub>2</sub> به سرعت به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه‌های سه گاو پس از اختلاط یکنواخت و از پارچه چهارلایه صاف شدند و با بافر حاوی ماکرومینرال، میکرومینرال، احیاکننده و ریسازورین بر اساس روش منک (Menke و همکاران، ۱۹۷۹) روش اصلاح شده منک و استینگز (Steingass و Menke، ۱۹۸۸) به نسبت یک سوم مایع شکمبه و دوسوم بزاق مصنوعی مخلوط شدند. مخلوط تهیه شده تحت جریان مداوم CO<sub>2</sub> در بالن سه‌دهنه و در دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد تا زمان انتقال به شیشه‌های آزمایش نگهداری شد. برای ارزیابی میزان تولید گاز در شیشه‌های انکوباسیون ۵۰۰ میلی گرمی از هر گروه تیمار آسیاب شده (Tagliapietra و همکاران، ۲۰۱۱) به اضافه عصاره مورد مطالعه به همراه ۵۰ میلی لیتر از مخلوط شیرابه و بافر مخلوط شده قبلی تحت گاز CO<sub>2</sub> در شیشه‌های مخصوص ۱۲۵ میلی لیتری ریخته با درپوش پلمپ شدند و در دمای ۳۹ درجه سلسیوس هر ۱ ساعت تکان داده شد. با استفاده از فشارسنج دیجیتال (Theodorou و همکاران، ۱۹۹۴) در ساعات ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۲۰ ساعت قرائت شد. به منظور تصحیح مقدار گاز تولیدی توسط شیرابه شکمبه در شرایط یکسان نمونه‌های فاقد جیره و عصاره به عنوان بلانک قرار داده شده است. در هر زمان با رابطه (۱) رگرسیونی حجم و فشار گاز و رابطه زیر با نرم افزار SAS 9/4 مقدار گاز تولیدی محاسبه شد.

رابطه ۱

$$GP = A (1 - e^{-c(T-L)})$$

در این رابطه، GP: تولید جمعی گاز در یک زمان مشخص بر حسب میلی لیتر است، A: پتانسیل کل تولید گاز یا حداکثر مقدار گازی است که می‌تواند طی تخمیر تولید شود بر حسب میلی لیتر، c: نرخ تولید گاز یا سرعت تخمیر در واحد ساعت<sup>-۱</sup>، T: زمان تخمیر بر حسب ساعت، و L: زمان تأخیر (Lag time) یا مدتی است که قبل از شروع واقعی تولید گاز طی می‌شود.

فراسنجه‌های شکمبه، همانند pH، جمعیت پروتوزوا، میزان متان تولیدی، اسیدهای چرب فرار، قابلیت هضم ماده خشک، انرژی قابل متابولیسم و ماده آلی قابل تخمیر نمونه‌ها بعد از انکوباسیون ۲۴ ساعته مجزا در هنگام انجام آزمون تولید گاز تعیین شد. اندازه‌گیری فراسنجه‌ها شامل میزان متان تولیدی مطابق روش دیمییر (۱۹۸۸) با اضافه کردن سدیم هیدروکسید ۱ نرمال به فلاسک ۲۴ ساعت انکوبه شده و قرائت تفاضل فشار گاز بعد ۱ دقیقه، شمارش پروتوزوا با لام نئوبار، رنگ‌آمیزی متیلن بلو و میکروسکوپ نوری، pH با pH متر، اسیدهای چرب فرار با استفاده از کروماتوگرافی گازی مطابق روش اوتنستی و بارتلی (۱۹۷۱) و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با استفاده از رابطه (۲) گتاجیو و همکاران (۲۰۰۲) انجام گرفت. محاسبات انرژی قابل متابولیسم و ماده آلی قابل تخمیر بر اساس روابط (۳) و (۴) روش منک و استینگز (۱۹۸۸) صورت گرفت.

رابطه ۲:

$$SCFA_{(mmol/L)} = 0.0222GP - 0.00425$$

SCFA: اسید چرب کوتاه زنجیر بر حسب میلی مول در لیتر، GP: تولید گاز بر حسب میلی لیتر ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک، ۰/۰۰۴۲۵ عدد ثابت منفی

رابطه ۳:

$$ME_{(MJ/Kg DM)} = 1.06 + (0.157 \times GP) + (0.084 \times CP) + (0.22 \times CF) - 0.081 \times CA$$

معیار تأیید بروز اسیدوز، کاهش مقدار pH در محیط تخمیر طی ۶ ساعت نخست پس از تزریق دکستروز بود، که با ثبات میزان pH در این بازه و کاهش فعالیت بافری مایع شکمبه همراه بود.

این آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شامل گروه شاهد، اسیدوز کنترل نشده، اسیدوز کنترل شده با ویرجینیامایسین، اسیدوز همراه با عصاره خالص و اسیدوز با عصاره نانولیپوزومال همانند شرایط انکوباسیون قبلی انجام و نتایج بعد از ۲۴ ساعت انکوباسیون مقادیر pH و مقدار گاز تولیدی همانند روش‌های بالا قرائت شدند.

برای سنجش تمامی پارامترها در سه دوره مجزا در روزهای متفاوت تکرار شد و در هر دوره حداقل ۳ فلاسک برای هر پارامتر با سه تکرار به ازای هر زمان اندازه گیری انجام شد. فلاسک‌هایی که بعد از گشوده شده مستلزم حذف بودند را با سه تکرار به ازای هر زمان اندازه گیری انجام شد. برای ارزیابی اثر افزودنی‌ها بر تولید گاز، متان و سایر فراسنجه‌های شکمبه‌ای، مدل‌های آماری شامل اثر اصلی تیمار و اثر دور اجرای آزمون (Run) در معادله ۵ استفاده شد. در تحلیل کینتیک تولید گاز نیز اثر روزهای انجام آزمون و زمان انکوباسیون به عنوان عامل تکرارشونده، همراه با اثر متقابل زمان × نوع افزودنی در مدل آماری معادله ۵ وارد گردید. تحلیل داده‌ها با رویه MIXED نرم‌افزار SAS 9.4 انجام شد و مقایسه میانگین‌ها بر اساس میانگین حداقل مربعات و آزمون توکی صورت گرفت.

رابطه ۵:

$$Y_{ij} = \mu + T_i + R_j + e_{ij}$$

Yi: مشاهده i، μ: میانگین کل مشاهدات، Ti: اثر

تیمار، Rj: اثر نوبت اجرا (روز انجام آزمون)، eij: اثر اشتباه آزمایشی

رابطه ۶:

$$Y_{ij} = \mu + T_i + I_{tj} + R_k + (T \times I)_{ij} + e_{ij}$$

ME: انرژی قابل متابولیسم (MJ/kg DM)، ۱/۰۶، ثابت معادله (بیانگر مقدار پایه انرژی متابولیسمی)، GP: مقدار تولید گاز بر حسب (ml/500 mg DM) با ۰/۱۵۷ ضریب ثابت تولید گاز، CP: پروتئین خام بر حسب درصد ماده خشک با ضریب ثابت ۰/۰۸۴، CF: فیبر خام بر حسب درصد ماده خشک با ضریب ثابت ۰/۲۲، CA: خاکستر خام بر حسب درصد ماده خشک با ضریب ثابت منفی ۰/۰۸۱

رابطه ۴:

$DOM(\%) = 0.9991 \times GP + 0.0595 \times CP + 0.0181 \times CA + 9$   
DOM: درصد ماده آلی قابل هضم در شکمبه (درصد ماده خشک) / GP: حجم تجمعی تولید گاز بر حسب (ml/500 mg DM) / CP: درصد پروتئین خام / CA:

درصد خاکستر خام

میزان نیتروژن آمونیاکی با استفاده از معرف‌های فتول و هیپوکلریت و با روش Kang و Broderick (۱۹۸۰) صورت گرفت. مقدار تجزیه پذیری بر حسب درصد با وزن خالص کاغذ صافی به گرم و وزن کاغذ به همراه نمونه‌های ۲۴ ساعت انکوباسیون صاف شده و آون شده به گرم و وزن خالص نمونه به گرم با رابطه (۵) زیر به دست آمد.

رابطه:

$$100 \times \frac{(\text{وزن نمونه و کف‌تعمیر بعد از آون (EP)} - (\text{وزن کف‌تعمیر (EP)})}{\text{وزن نمونه}} = (\%) \text{ تجزیه پذیری}$$


جهت بررسی اثر عصاره‌ها بر اسیدوز شکمبه در شرایط آزمایشگاهی آزمون‌ی را طراحی و با تزریق دکستروز به شیرابه شکمبه‌های داخل فلاسک‌ها باعث القا اسیدوز شکمبه شد. در این آزمایش القای اسیدوز، دکستروز با غلظت ۵ درصد (وزنی-حجمی) به محیط تخمیر افزوده شد تا از طریق افزایش سریع تخمیر قندها موجب افت pH و شیبه‌سازی شرایط اسیدوز شکمبه‌ای گردد. برای هر فلاسک حاوی ۲۰۰ میلی‌لیتر مایع شکمبه، ۱۰ میلی‌لیتر محلول دکستروز ۵ درصد تزریق شد.

عصاره شیرین بیان نشان داد که ذرات دارای یک پیک اصلی با میانگین قطر هیدرودینامیکی  $122.02$  نانومتر (نمودار ۱) و شاخص  $PDI=0.13$  بوده‌اند که نشان‌دهنده یکنواختی مطلوب اندازه ذرات است. این ویژگی‌ها با کاربری نانولیپوزوم‌ها در سامانه‌های دارورسانی سازگار است.

Yi: مشاهده  $i$ ،  $\mu$ : میانگین کل مشاهدات، Ti: اثر تیمار، R: اثر نوبت اجرا (روز انجام آزمون)، Itj: اثر زمان انکوباسیون،  $(T \times It)$  اثر متقابل زمان انکوباسیون و نوع فرآوری، eij: اثر اشتباه آزمایشی

### نتایج و بحث

نتایج آنالیز پراکندگی نور دینامیکی DLS: بررسی DLS (آنالیز پراکندگی نور دینامیکی) نانولیپوزوم‌های




نمودار ۱: آنالیز پراکندگی نور دینامیکی نانولیپوزومال عصاره شیرین بیان

Figure 1: Dynamic light scattering analysis of nanoliposomal licorice extract

اندازه‌های نانولیپوزوم‌ها  $255$  نانومتر را نشان داد. توزیع نسبتاً یکنواخت اندازه‌ها و تجمع حداقلی ذرات بیانگر تشکیل موفق نانو ساختارهای لیپیدی پایدار بوده و با نتایج آنالیز DLS سازگار است.

نتایج تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM: نتایج SEM نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره شیرین بیان، ذرات با اشکال کروی با سطح صاف و بدون نقص قابل توجه را نشان داد (شکل ۱). میانگین



شکل ۱: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ذرات نانولیپوزوم‌های عصاره شیرین بیان

Image 1: Scanning electron microscope (SEM) image of licorice extract nanoliposome particles

تولید گاز: نتایج تولید گاز تجمعی و شاخص‌های کنتیکی تولید گاز در جدول ۱، ایجاد تغییرات الگوی تخمیر و تولید گاز در جیره‌های اسیدوزی را توسط هر دو گروه تیمار نشان می‌دهد. در نتایج تولید گاز دو ساعت اول اختلاف معناداری میان تیمارها و گروه شاهد مشاهده نشد. در ساعات میانی انکوباسیون (۴ تا ۱۲ ساعت) تیمار حاوی عصاره خالص شیرین‌بیان و تیمار نانولیپوزوم‌های عصاره شیرین‌بیان تولید گاز بالاتری نسبت به شاهد داشتند. در زمان‌های بلندمدت‌تر (۲۴ تا ۱۲۰ ساعت) مقدار گاز تولیدی در تیمار شیرین‌بیان کمتر از شاهد بود. نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره نیز روندی مشابه نشان دادند؛ به طوری که از ۲۴ ساعت به بعد میزان گاز تولیدی را در جیره اسیدوزی کاهش دادند ( $P < 0/0001$ ). با وجود تشابه رفتاری هر دو شکل عصاره (خالص و نانولیپوزومال) اما در تیمار نانولیپوزوم‌ها در ۴ ساعت اولیه تخمیر افزایش تولید گاز بیشتری؛ و از سوی دیگر در دوره ۴۸ تا ۱۲۰ ساعت کاهش تولید گاز بیشتری از عصاره خالص داشت. در بازه ۴ تا ۲۴ ساعت اختلاف معنی‌داری میان دو تیمار مشاهده نشد ( $P < 0/0001$ ). همچنین هر دو گروه تیمار کاهش معنی‌دار در پتانسیل تولید گاز (B) نسبت به شاهد نشان دادند، اما تفاوتی میان آن‌ها دیده نشد ( $P = 0/036$ ). در گروه شاهد ۱۴۹/۵۵ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک و در تیمارهای عصاره خالص و نانولیپوزومال به ترتیب ۱۳۸/۴۸ و ۱۳۸/۲۱ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک بود. نرخ تولید گاز (C) در شاهد ۰/۰۲ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک، در عصاره خالص ۰/۰۳ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک و در نانولیپوزوم ۰/۰۴ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک بود و هر دو تیمار بدون اختلاف معنی‌دار بین دو تیمار نرخ بالاتری نسبت به شاهد داشتند ( $P = 0/028$ ). زمان تأخیر (Lag time) نیز در

شاهد ۱/۰۹ ساعت و در تیمارهای عصاره خالص و نانولیپوزومال به ترتیب ۰/۳۲ و ۰/۰۶ ساعت بود که نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار این شاخص در هر دو تیمار نسبت به شاهد اما بدون تفاوت معنی‌دار میانشان است ( $P = 0/016$ ).

عدم تفاوت معنی‌داری میان گروه‌ها در دو ساعت نخست نشان می‌دهد که عصاره شیرین‌بیان و شکل نانولیپوزومال آن اثر فوری بر آغاز فرایند تخمیر ندارند. با این حال، در ساعات میانی تخمیر (۲ تا ۱۲ ساعت) تفاوت افزایش معنی‌دار تولید گاز در تیمارها کاهش زمان تأخیر، تسریع در آغاز فعالیت میکروبی و تغییر مسیر تخمیر به وسیله تیمارها است؛ که این موضوع را کم بودن Lag time تیمارها نسبت به شاهد و همچنین با بالا بودن نرخ تولید گاز (C) در گروه تیمارها قابل درک است. از طرفی ترکیبات زیست‌فعال شیرین‌بیان از طریق اثرات ضد میکروبی بر گروه‌های خاص پروتوزوا یا باکتری‌های متصل به فیبر یا حتی باکتری‌های تولیدکننده اسیدلاکتیک، سبب تغییرات موقتی در مسیر تخمیر و در نتیجه افزایش تولید گاز در ساعات اولیه شده باشند. این تغییرات معمولاً با فعال‌سازی سریع‌تر مسیرهای پروپیونات‌زایی همراه است، مسیری که عمدتاً به فعالیت باکتری‌هایی نظیر *Megasphaera elsdenii* وابسته است و پیش‌تر نیز نشان داده شده که در کاهش لاکتات نقش کلیدی دارد (Nagaraja و همکاران، ۱۹۸۷). کاهش مشابه در تولید گاز حدود ۲۴ ساعت از آغاز تخمیر، در هر دو تیمار بیانگر شروع اثر تعدیلی شیرین‌بیان بر تولید گازهای شکمبه از این زمان به بعد است. این اثر تعدیلی کاهش تولید گاز در ساعات دیررس (۴۸ تا ۱۲۰ ساعت) به دلیل رهایش آهسته و کنترل‌شده‌تر ماده مؤثره در ساختار نانولیپوزوم چشمگیرتر از عصاره خالص است. از آنجاکه یکی از اهداف استفاده از فناوری نانولیپوزومی، افزایش پایداری ترکیبات

کارآمدتر در طول زمان فرایند تخمیر را تعدیل کنند و با کاهش تولید گازهای شکمبه، ریسک اسیدوز را در مراحل دیرتر تخمیر کاهش دهند.

گیاهی و ایجاد امکان اثرگذاری طولانی‌تر در محیط شکمبه است، الگوی مشاهده شده در نمودار ۲ به‌طور مستقیم از این فرض پشتیبانی می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که نانولیپوزوم‌ها قادرند به شکلی

جدول ۱- تأثیر افزودن عصاره شیرین بیان خالص و نانولیپوزومال در جیره اسیدوزی بر حجم گاز تولیدی تجمعی در زمان‌های مختلف و ضرایب کنتیکی تولید گاز (میلی لیتر به ازای ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک)

Table 1. Effects of adding pure licorice extract and nanoliposomal licorice extract to an acidogenic diet on cumulative gas production at different incubation times and gas production kinetic parameters (mL per 500 mg of dry matter)


تیمارها Groups					
سطح معنی داری P-value	اشتباه معیار میانگین SEM	عصاره نانولیپوزومال Nanoliposome extract	عصاره خالص Pure extract	شاهد Control	زمان‌های انکوباسیون Incubation times
<0.0001	0.60	5.63	5.18	5.03	2
<0.0001	0.60	9.47 <sup>a</sup>	7.28 <sup>ab</sup>	7.68 <sup>b</sup>	4
<0.0001	0.60	16.31 <sup>a</sup>	16.01 <sup>a</sup>	13.54 <sup>b</sup>	6
<0.0001	0.60	22.02 <sup>a</sup>	22.10 <sup>a</sup>	18.88 <sup>b</sup>	8
<0.0001	0.60	27.29 <sup>a</sup>	28.41 <sup>a</sup>	24.15 <sup>b</sup>	10
<0.0001	0.60	36.07 <sup>a</sup>	37.49 <sup>a</sup>	34.43 <sup>b</sup>	12
<0.0001	0.60	56.00 <sup>b</sup>	57.50 <sup>b</sup>	59.22 <sup>a</sup>	24
<0.0001	0.60	85.34 <sup>c</sup>	88.12 <sup>b</sup>	91.49 <sup>a</sup>	48
<0.0001	0.60	108.58 <sup>c</sup>	112.62 <sup>b</sup>	117.64 <sup>a</sup>	72
<0.0001	0.60	117.89 <sup>c</sup>	123.20 <sup>b</sup>	129.71 <sup>a</sup>	96
<0.0001	0.60	123.90 <sup>c</sup>	128.84 <sup>b</sup>	136.32 <sup>a</sup>	120
ضرایب Coefficient					
0.036	3.40	133.21 <sup>b</sup>	138.84 <sup>b</sup>	149.55 <sup>a</sup>	B ml/500 mg ) (DM
0.028	0.001	0.024 <sup>a</sup>	0.023 <sup>a</sup>	0.021 <sup>b</sup>	C ml/500 mg ) (DM
0.016	0.04	0.06 <sup>b</sup>	0.32 <sup>b</sup>	1.09 <sup>a</sup>	Lag time (h)

در هر ردیف میانگین‌های با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند ( $P < 0.05$ ).

B: پتانسیل تولید گاز برحسب ml/500 mg DM; C: نرخ تولید گاز برحسب Lag time ml/500 mg DM; زمان تأخیر شروع فرایند تخمیر

Means within each row with different superscript letters are significantly different ( $P < 0.05$ )

B: Gas production potential(ml/500 mg DM), C: Gas production rate(ml/500 mg DM)



نمودار ۲: نمودار مقایسه‌ای اثرات متفاوت گروه‌های تیمار و شاهد در زمان‌های مختلف بر کینتیک تولید گاز در جیره اسیدوزی

Figure 2: Comparative effects of different experimental groups and control on gas production kinetics at various incubation times in acidogenic diet

نتایج مربوط به VFA نیز با افزایش بوتیرات و کاهش استات در تیمارهای شیرین‌بیان، همراه با کاهش پروپیونات و ایزوبوتیرات و کاهش کل VFA، همگی نشان‌دهنده انتقال مسیر تخمیر از تولید اسیدهای چرب غالب شکمبه به سمت یک الگوی تعدیل‌شده‌تر تخمیر همانند نتایج تولید گاز است. کاهش استات و کل VFA، مکانیسم اثر مشابه مونسین دارد که با کاهش شدت تخمیر برای پیشگیری از اسیدوز تحت‌حاد استفاده می‌شود (Ahmed و همکاران، ۲۰۲۲). از طرفی افزایش بیش از حد تحمل VFA حرکات دستگاه گوارش را سرکوب می‌کند که این کاهش VFA کل توسط تیمارها می‌تواند بر کاهش حرکات شکمبه اثر مثبت داشته باشد و در سازوکارهای جلوگیری از اسیدوز و عوارض آن نقش حمایتی ایفا کند (Crichlow و Chaplin، ۱۹۸۵).

اسیدهای چرب فرار: جدول ۲ نتایج تأثیر استفاده از عصاره خالص شیرین‌بیان و نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره بر ترکیب اسیدهای چرب فرار شکمبه را نشان می‌دهد. هر دو تیمار عصاره خالص (۲۴/۶۰) و نانولیپوزوم عصاره (۲۴/۶۴) موجب افزایش معنی‌دار درصد بوتیریک اسید نسبت به گروه شاهد (۲۱/۹۶) شدند. در مقابل، کاهش غلظت استیک اسید (از مقدار ۵۱/۰۲ درصد در شاهد به ۴۸/۱۸ درصد در عصاره خالص و ۴۹/۳۰ درصد در تیمار نانولیپوزومال)؛ کاهش مجموع پروپیونیک و ایزوبوتیریک اسید از ۲۶/۰۳ درصد به ترتیب به ۲۵/۱۱ درصد و ۲۴/۹۸ درصد در تیمارهای عصاره خالص و نانولیپوزومال ثبت شده است. علاوه بر این، کل اسیدهای چرب فرار نیز از ۷۴/۳۳ میلی‌مول در لیتر در گروه شاهد به ۷۱/۱۴ در تیمار خالص و ۷۱/۰۹ میلی‌مول در لیتر در تیمار نانولیپوزوم کاهش یافت.

جدول ۲- تأثیر افزودن عصاره شیرین بیان خالص و نانولیپوزومال در جیره اسیدوزی بر اسیدهای چرب فرار تولیدی در مدت ۲۴ ساعت انکوباسیون

Table 2. Effect of adding free and nanoliposome-encapsulated licorice extract to an acidotic diet on volatile fatty acid production after 24 h of incubation

سطح معنی داری P-value	اشتباه معیار میانگین SEM	تیمار Groups			فرا سنج‌های تخمیری Fermentation parameter
		عصاره نانولیپوزومال Nanoliposome extract	عصاره خالص Pure extract	شاهد Control	
0.02	0.26	71.09 <sup>b</sup>	71.14 <sup>b</sup>	74.33 <sup>a</sup>	کل اسیدهای چرب فرار (میلی مول در لیتر) Total VFA (mmol/L)
0.08	0.026	0.63	0.71	0.50	اسید والریک (درصد) (%) Valeric acid
0.13	0.015	0.42	0.37	0.47	اسید ایزو والریک (درصد) (%) Isovaleric acid
0.02	0.23	24.65 <sup>a</sup>	24.60 <sup>a</sup>	21.96 <sup>b</sup>	اسید بوتیریک (درصد) Butyric acid (درصد)
0.03	0.09	24.98 <sup>c</sup>	25.11 <sup>b</sup>	26.03 <sup>a</sup>	پروپیونیک + ایزو بوتیریک (درصد) Propionic + isobutyric (%) acid
0.01	0.15	49.30 <sup>b</sup>	48.18 <sup>c</sup>	51.02 <sup>a</sup>	اسید استیک (درصد) (%) Acetic acid

در هر ردیف میانگین‌های با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند ( $P < 0.05$ ).

Means within each row with different superscript letters are significantly different ( $P < 0.05$ )

همکاران، ۲۰۱۵؛ Vaghar Seyedin و همکاران، ۲۰۲۲) که یکی از اهداف مطالعه بررسی تیمارها جهت جلوگیری از اسیدوز و عوارض آن در عین حال کاهش تولید متان است. باید توجه داشت که در اسیدوز تحت حاد بر خلاف اسیدوز حاد که در اثر تولید، تجمع و جذب اسیدلاکتیک کاهش pH و بروز علائم داریم؛ در اسیدوز تحت حاد کاهش pH به علت تجمع مزمن VFA بوده و اسیدلاکتیک موجود با میکروفلور پویا متابولیزه و به اسید چرب فرار تبدیل می‌شود (González و همکاران، ۲۰۱۲؛ Slyter، ۱۹۷۶). در مطالعه Ramos-Morales و همکاران (۲۰۱۸) استفاده از ۲ گرم بر لیتر عصاره موجب کاهش مجموع اسیدهای چرب فرار (VFA) شده است که با نتایج حاصله ما هم سو است.

با این حال، برخلاف مطالعه Darat و همکاران (۲۰۲۱) که تغذیه شیرین بیان اثر معناداری بر VFA نداشت، یافته‌های حاضر نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه عصاره با دوز و نسبت جیره متفاوت بوده و این اختلاف احتمالاً از تفاوت در سطح مصرف، روش استخراج، یا نسبت علوفه به کنسانتره ناشی شود اما از طرفی همسو با این مطالعه اضافه کردن عصاره خالص شیرین بیان تغییری در اسیدهای چرب فرار شاخه‌دار (اسید والریک و ایزووالریک) ایجاد نکرده بود. از جنبه دیگر مسیرهای تولید استات و بوتیرات بر خلاف مسیر پروپیونات تولیدکننده  $H_2$  و متان است. غلظت بالای  $H_2$  شکمبه باعث افزایش تخمیر پروپیونات می‌شود و تغییر در تعادل VFA کاهش تولید متان را منجر می‌شود (Harfoot، ۱۹۸۱؛ Moss و همکاران، ۲۰۰۰؛ Reid و همکاران، ۱۹۸۰؛ Sejian

از ۶/۷۴ در شاهد به ۶/۸۱ در عصاره خالص و ۶/۸۹ در نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره رسید و میانگین pH در تیمار نانولیپوزومال به طور معنی‌داری بالاتر از تیمار عصاره خالص بود ( $P=0/01$ ). بیشترین تغییرات غلظت ازت آمونیاکی مربوط به تیمار نانولیپوزوم‌ها (۱۲/۵۹ میلی‌مول بر لیتر) بوده و از ۱۰/۰۶ در شاهد به ۱۱/۵۷ میلی‌مول بر لیتر در تیمار عصاره خالص به طور معنی‌داری افزایش یافت ( $P=0/03$ ). درصد تجزیه‌پذیری خوراک نیز تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت؛ به طوری‌که مقدار آن در تیمار عصاره خالص (۳۵ درصد) به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (۳۶/۵ درصد) و تیمار نانولیپوزومال (۳۵/۵۱ درصد) بود ( $P=0/04$ ).

فراسنجه‌های تخمیری: نتایج این پژوهش در جدول ۳ نشان می‌دهد که افزودن عصاره خالص شیرین‌بیان و نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره به جیره اسیدوزی میزان متان بعد ساعت ۲۴ از ۴۲/۳۴ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک در گروه شاهد به ۴۰/۷۲ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک در تیمار عصاره خالص و ۳۹/۸۶ میلی‌لیتر در ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک در تیمار نانولیپوزومال به طور معنی‌دار کاهش یافت ( $P=0/02$ ). جمعیت پروتوزوآهای شکمبه نیز از  $19.2 \times 10^6$  تک یاخته در هر میلی‌لیتر در شاهد به  $18.7 \times 10^6$  در تیمار عصاره خالص و  $18 \times 10^6$  تک یاخته در هر میلی‌لیتر در نانولیپوزوم‌ها کاهش پیدا کرد و شدت کاهش در تیمار نانولیپوزومال بیشتر از عصاره خالص بود ( $P=0/01$ ). همچنین مقدار pH

جدول ۳- تأثیر افزودن عصاره شیرین‌بیان خالص و نانولیپوزومال در جیره اسیدوزی بر فراسنجه‌های تخمیری در مدت ۲۴ ساعت انکوباسیون

Table 3: Effect of adding pure and nanoliposome-encapsulated licorice extract to acidogenic diet on fermentation parameters after 24 h incubation.

سطح معنی‌داری P-value	اشتباه معیار میانگین SEM	تیمار Groups			فراسنجه‌های تخمیری Fermentation parameters
		عصاره نانولیپوزومال Nanoliposome extract	عصاره خالص Pure extract	شاهد Control	
0.02	0.16	39.86 <sup>b</sup>	40.72 <sup>b</sup>	42.34 <sup>a</sup>	متان (میلی‌لیتر به ازای ۵۰۰ میلی‌گرم ماده خشک) Methane (mL per 500 mg DM)
0.01	0.07	6.89 <sup>a</sup>	6.81 <sup>b</sup>	6.74 <sup>c</sup>	pH
0.01	0.06	18.00 <sup>c</sup>	18.70 <sup>b</sup>	19.20 <sup>a</sup>	جمعیت پروتوزوآیی ( $\times 10^6/ml$ ) Protozoa population (cells $\times 10^5$ mL)
0.03	0.20	12.59 <sup>a</sup>	11.57 <sup>ab</sup>	10.06 <sup>b</sup>	ازت آمونیاکی (میلی‌مول بر لیتر) Ammonia (mmol/L)
0.04	0.20	35.51 <sup>a</sup>	35.00 <sup>b</sup>	36.50 <sup>a</sup>	تجزیه‌پذیری (درصد) (%) Dry matter digestibility

در هر ردیف میانگین‌های با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند ( $P < 0.05$ ).

Means within each row with different superscript letters are significantly different ( $P < 0.05$ )

کاهش انرژی متابولیسمی در تیمارهای مطالعه حاضر با یافته‌های Liang و همکاران (۲۰۲۴) همسو است که گزارش کرده بودند عصاره شیرین بیان قادر است با بهبود میکروبیوم شکمبه، الگوی تخمیر را تعدیل و نشخوار را بهینه‌سازی کند. در این نتایج اگرچه در نگاه اول ممکن است به‌عنوان یک اثر منفی بر قابلیت هضم تلقی شود، اما با توجه به شرایط آزمایش (جیره اسیدوزی) و هدف احتمالی مدیریت تخمیر شکمبه برای کاهش خطر اسیدوز، قابل توجیه است.

شیرین بیان (*Glycyrrhiza glabra*) حاوی ترکیبات زیست فعال متعددی از جمله گلیسیریزین، فلاونوئیدها و ترکیبات فنولی است (Asl و Hosseinzadeh, 2008). این ترکیبات دارای خواص ضد میکروبی شناخته شده‌ای هستند و می‌توانند بر جمعیت میکروبی شکمبه تأثیر بگذارند. تحقیقات نشان داده‌اند که ترکیبات فنولی و ساپونینی موجود در شیرین بیان می‌توانند با ایجاد اختلال در غشای سلولی باکتری‌ها، به ویژه باکتری‌های گرم مثبت، باعث مهار رشد و فعالیت آن‌ها شوند (Bodas و همکاران، 2012). از آنجایی که باکتری‌های گرم مثبت نقش مهمی در تخمیر مواد غذایی و تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه ایفا می‌کنند، مهار آن‌ها می‌تواند منجر به کاهش تولید SCFA و در نتیجه کاهش انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم ماده آلی شود. این مکانیسم می‌تواند توجیه‌کننده کاهش مشاهده شده در هر سه فراسنجه در تیمار حاوی عصاره خالص باشد.

مطالعات مختلف حیوانی نیز عدم تأثیر سوء کاهش فراسنجه‌های این پژوهش را تقویت می‌کنند. همراه با کاهش پروتوزوآ و متان در مطالعه Abarghuei و Salem (۲۰۲۱)؛ بهبود وزن لاشه در بزهای تغذیه شده با ۵ درصد شیرین بیان در مطالعه Towaje و همکاران (۲۰۲۰)؛ اضافه کردن پودر شیرین بیان در جیره باعث افزایش وزن از شیرگیری و کاهش سن از شیرگیری در

گوساله‌ها در مطالعه Haliroodi و همکاران (۲۰۲۴) و نیز بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ایمنی در پژوهش Guo و همکاران (۲۰۱۹) همگی نشان می‌دهند که ترکیبات موجود در ریشه شیرین بیان ویژگی‌هایی مانند کاهش بار میکروبی مخرب، تعدیل مسیرهای تخمیری و حفاظت از اپیتلیوم شکمبه بدون اثر سوء هستند.

نکته قابل توجه در این پژوهش، تأثیر بارزتر عصاره نانولیپوزومال در کاهش فراسنجه‌های تخمیری است. نانولیپوزوم‌ها به عنوان سیستم‌های حامل، قادرند ترکیبات زیست فعال را درون خود محصور کرده، از تخریب زودهنگام آن‌ها در محیط شکمبه جلوگیری کرده و فراهمی زیستی و دسترسی آن‌ها را برای برهم‌کنش با سلول‌های میکروبی افزایش دهند (DJEJBAR و همکاران، 2024). به عبارت دیگر، نانولیپوزوماسیون ممکن است باعث رهاشد کنترل شده و هدفمندتر ترکیبات مؤثر عصاره در محیط کشت شده و در نتیجه اثر مهاری قوی‌تری بر جمعیت میکروبی اعمال کرده باشد. این موضوع با یافته‌های سایر محققان که نشان داده‌اند نانوکپسولاسیون می‌تواند کارایی ترکیبات ضد میکروبی گیاهی را بهبود بخشد، همخوانی دارد (Phupaboon و همکاران، 2025). بنابراین، کاهش شدیدتر فراسنجه‌ها در تیمار نانولیپوزومال را می‌توان به اثربخشی بیشتر این فرم از عصاره نسبت داد.

از منظر تغذیه دام و مدیریت اسیدوز، کاهش تولید SCFA و قابلیت هضم ماده آلی در یک جیره اسیدوزی می‌تواند یک اثر مطلوب تلقی شود. اسیدوز شکمبه‌ای تحت‌حاد (SARA) معمولاً به دلیل تخمیر کربوهیدرات‌های قابل تخمیر و تولید مزمن اسیدهای چرب فرار رخ می‌دهد (Kleen و همکاران، 2003) با کاهش سرعت و میزان تخمیر از طریق افزودن ترکیبات گیاهی مانند شیرین بیان، می‌توان از تجمع

میلی گرم ماده خشک) و شاهد مثبت (۱۵/۶ میلی لیتر به ازای ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک) بود. در حالی که تیمار حاوی عصاره شیرین بیان خالص (۲۷/۴۱ میلی لیتر به ازای ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک) و نانولیپوزومال (۲۸/۲۳ میلی لیتر به ازای ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک) بیشترین میزان تولید گاز را نشان دادند ( $P < 0.0001$ ). در ارزیابی pH نیز مقادیر ثبت شده در گروه شاهد ۶/۸۸، در اسیدوز کنترل نشده ۶/۰۵ و در شاهد مثبت ۶/۱۷ بود. pH در تیمارهای عصاره خالص و نانولیپوزومال به طور معنی داری بیشتر از هر دو گروه اسیدوز و شاهد مثبت ویرجینامایسین بود ( $P < 0.0001$ ).

اسید در شکمبه جلوگیری کرده و pH را در محدوده ایمن تری حفظ نمود. هر چند که این کاهش تخمیر ممکن است با اندکی افت در انرژی دریافتی روزانه همراه باشد، اما مزیت آن در پیشگیری از عوارض اسیدوز و حفظ سلامت حیوان می تواند این کاهش جزئی را جبران کند. اسیدوز القایی: اثرات عصاره خالص شیرین بیان و نانولیپوزومال های حاوی عصاره در شرایط اسیدوزی القایی در جدول ۵ آورده شده است که میزان گاز تولیدی در تیمار اسیدوز کنترل نشده (۲۶/۴ میلی لیتر به ازای ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک) به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد (۱۲/۳۶ میلی لیتر به ازای ۵۰۰

جدول ۵- تأثیر افزودن عصاره شیرین بیان خالص و نانولیپوزومال بر اسیدوز شکمبه ای القا شده

Table 5- Effect of adding pure and nanoliposomal licorice extract on induced rumen acidosis

سطح معنی - داری P-value	اشتباه معیار میانگین SEM	تیمار Groups		شاهد مثبت Positive control	اسیدوز کنترل نشده Uncontrolle d acidosis	شاهد Control	فرا سنج‌های تخمیری Fermentation parameters
		عصاره نانولیپوزومال Nanoliposo me extract	عصاره خالص Pure extract				
<0.0001	0.13	28.23 <sup>a</sup>	27.41 <sup>a</sup>	15.60 <sup>c</sup>	26.40 <sup>b</sup>	12.36 <sup>d</sup>	گاز تولیدی میلی لیتر به ازای ۵۰۰ میلی گرم ماده خشک بعد ۲۴ ساعت Gas production (mL/500 mg DM) 24 <sup>th</sup> hour
<0.0001	0.01	6.40 <sup>b</sup>	6.36 <sup>b</sup>	6.17 <sup>c</sup>	6.05 <sup>d</sup>	6.88 <sup>a</sup>	pH

در هر ردیف میانگین‌های با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند ( $P < 0.05$ ).


Means within each row with different superscript letters are significantly different ( $P < 0.05$ ).

pH شکمبه را در سطح بالاتری (۶/۱۷) حفظ کند که این نتیجه می تواند ناشی از مهار باکتری‌های تولیدکننده اسید نظیر *Streptococcus bovis* باشد. در مقایسه با این دو گروه، تیمارهای عصاره خالص شیرین بیان و نانولیپوزومال های حاوی عصاره شیرین بیان باعث افزایش تولید گاز حتی بالاتر از گروه اسیدوز کنترل نشده شدند، اما توانستند pH را در محدوده نسبتاً پایدار (به ترتیب ۶/۳۶ و ۶/۴۰) نگه‌دارند. این

نوع تیمارهای مورد مطالعه در اسیدوز القایی نقش تعیین کننده ای در میزان تولید گاز و تغییرات pH محیط شکمبه (نمودار ۳) دارد. القای اسیدوز در گروه اسیدوز کنترل نشده موجب افزایش قابل توجه تولید گاز و کاهش pH تا سطح ۶/۰۵ شد؛ وضعیتی که با افزایش سریع تخمیر، تجمع اسیدهای چرب فرار و انباشت لاکتات در شکمبه مطابقت دارد. در مقابل، گروه شاهد مثبت توانست تولید گاز را کاهش داده و

جهت مسیر تخمیر به سمت تولید اسیدهای چرب فرار با خاصیت اسیدی کمتر مانند پروپیونات رخ می‌دهد. با این حال افزایش تولید گاز احتمالاً به تغییر در جمعیت میکروبیوم و افزایش فعالیت متانوژن‌ها مربوط است، موضوعی که نیازمند بررسی‌های تکمیلی است تا احتمال بروز مشکلاتی مانند نفخ ارزیابی شود.

ویژگی نشان می‌دهد که عصاره شیرین بیان به‌ویژه در قالب نانولیپوزوم قادر است شدت اسیدوز را بدون مهار کامل تخمیر کاهش دهد و محیط شکمبه را در محدوده عملکردی مطلوب حفظ کند. این موضوع اهمیت ویژه‌ای در دام‌های پرتولید با جیره اسیدوژن دارد که حساسیت بیشتری به اسیدوز شکمبه نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد این تعدیل pH از طریق تغییر



نمودار ۳ نمودار مقایسه مقدار pH در مقادیر تولید گاز مختلف گروه‌های مختلف اسیدوز القا

Figure 3: Comparison of pH values at different levels of gas production in various induced acidosis groups

ویژگی مهم عصاره شیرین بیان آن است که در شرایط طبیعی موجب افزایش غیرضروری pH نمی‌شود؛ اما در شرایط اسیدوزی، با مهار میکروارگانیسم‌های تولیدکننده اسید و تعدیل تخمیر، از افت بیشتر pH جلوگیری می‌کند. تبدیل عصاره شیرین بیان به نانولیپوزوم سبب پایداری بیشتر و رهایش آهسته‌تر ترکیبات فعال آن شده و کارایی این ترکیب را در تعدیل طولانی‌مدت تخمیر شکمبه افزایش می‌دهد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این ترکیب، به‌ویژه در فرم نانولیپوزومی، ظرفیت بالقوه‌ای برای استفاده در

مطالعات قبلی Rahchamani و همکاران (۲۰۱۹) نشان دادند که افزودن ۱۰ درصد پودر شیرین بیان در جیره گوسفندان، با وجود کاهش باکتری‌های لاکتیک اسید و افزایش پرتوزوآ، pH شکمبه را تغییر نداده است. تفاوت نتایج می‌تواند ناشی از طبیعی بودن شرایط شکمبه در تحقیق راه‌چمنی باشد؛ زیرا pH در گروه کنترل آن مطالعه نیز در محدوده فیزیولوژیک باقی‌مانده بود. در حالی که در مطالعه حاضر، تیمارها در شرایط «چالش اسیدوز» بررسی شدند که نیازمند خواص تعدیل‌کنندگی شدیدتر بود.

جیره دام‌های پر تولید باهدف پیشگیری از اسیدوز و بهبود بهینگی بازده تولیدی دارد.

### نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه *in vitro* نشان داد که افزودن عصاره شیرین بیان، به‌ویژه در فرم نانولیپوزومال، توانست تخمیر شکمبه را در شرایط چالش اسیدوزی به‌طور معنی‌داری تعدیل کند؛ به‌طوری‌که نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره در مقایسه با عصاره خالص، کاهش پایدارتر تولید گاز تجمعی، پتانسیل تولید گاز، اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر و انرژی متابولیسمی را نشان دادند و هم‌زمان زمان تأخیر تخمیر را کاهش

دادند که بیانگر تغییر کنترل‌شده الگوی تخمیر است. این اثرات احتمالاً به رهایش آهسته و تدریجی ترکیبات فعال در سامانه نانولیپوزومال مربوط بوده و موجب حفظ فعالیت میکروبی بدون تشدید شرایط اسیدی می‌شود. با این حال، از آنجا که نتایج تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل‌شده به‌دست آمده‌اند، کاربرد آن‌ها به‌عنوان افزودنی گیاهی بالقوه و جایگزین طبیعی آنتی‌بیوتیک‌ها در جیره‌های پرکنسانتره نیازمند تأیید از طریق مطالعات *in vivo* بوده و تعمیم مستقیم به شرایط مزرعه باید با احتیاط صورت گیرد.

### منابع

- Abarghuei, M. J., & Salem, A. Z. M. (2021). Sustainable impact of pulp and leaves of *Glycyrrhiza glabra* to enhance ruminal biofermentability, protozoa population, and biogas production in sheep. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 33371-33388.
- Ahmed, M. G., Al-Sagheer, A. A., El-Zarkouny, S. Z., & Elwakeel, E. A. (2022). Potential of selected plant extracts to control severe subacute ruminal acidosis *in vitro* as compared with monensin. *BMC Veterinary Research*, 18(1), 356.
- Asl, M. N., & Hosseinzadeh, H. (2008). Review of pharmacological effects of *Glycyrrhiza* sp. and its bioactive compounds. *Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives*, 22(6), 709-724.
- Benchaar, C., Calsamiglia, S., Chaves, A. V., Fraser, G., Colombatto, D., McAllister, T. A., & Beauchemin, K. A. (2008). A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production. *Animal Feed Science and Technology*, 145(1-4), 209-228.
- Benchaar, C & ,Greathead, H. (2011). Essential oils and opportunities to mitigate enteric methane emissions from ruminants. *Animal Feed Science and Technology*, 166, 338-355.
- Bodas, R., Prieto, N., García-González, R., Andrés, S., Giráldez, F. J., & López, S. (2012). Manipulation of rumen fermentation and methane production with plant secondary metabolites. *Animal Feed Science and Technology*, 176(1-4), 78-93.
- Broderick, G., & Kang, J. (1980). Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and *in vitro* media. *Journal of Dairy Science*, 63(1), 64-75.
- Chen, Y., Tang, Y., Li, Y., Rui, Y., & Zhang, P. (2024). Enhancing the Efficacy of Active Pharmaceutical Ingredients in Medicinal Plants through Nanoformulations: A Promising Field. *Nanomaterials*, 14(19), 1598. <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/19/1598>
- Cheng, X., Yan, H., Pang, S., Ya, M., Qiu, F., Qin, P., Zeng, C., & Lu, Y. (2022). Liposomes as multifunctional nano-carriers for medicinal natural products. *Frontiers in chemistry*, 10, 963004.
- Crichlow, E., & Chaplin, R. (1985). Ruminal lactic acidosis: Relationship of forestomach motility to nondissociated volatile fatty acids levels. *American Journal of Veterinary Research*, 46(9), 1908-1911.

- Crosson, P., Shalloo, L., O'Brien, D., Lanigan, G., Foley, P., Boland, T., & Kenny, D. (2011). A review of whole farm systems models of greenhouse gas emissions from beef and dairy cattle production systems. *Animal Feed Science and Technology*, 166, 29-45 .
- Darat, P., Fatahnia, F., Taasoli, G., Mirzaei-Alamouti, H., & Khatibjou, A. (2021). Effect of Licorice extract on in vitro rumen fermentation parameters of diets containing different levels of concentrate. *Animal Science Research*, 30(4), 27-39 .(In Persian).
- Demeyer, D., Meulemeester, M. d., Graeve, K. d., & Gupta, B. (1988). Effect of fungal treatment on nutritive value of straw .
- DJEBBAR, B., HELLALI, D. H., & MERZOUGUI, H. (2024). A Systematic Review of Nano-Encapsulation for Improving the Bioavailability of Dietary Supplements and Nutraceuticals. *Journal of Drug Delivery & Therapeutics*, 14(10).
- El-Saber Batiha, G., Magdy Beshbishy, A., El-Mleeh, A., M. Abdel-Daim, M., & Prasad Devkota, H. (2020). Traditional uses, bioactive chemical constituents, and pharmacological and toxicological activities of *Glycyrrhiza glabra* L.(Fabaceae). *Biomolecules*, 10(3), 352 .
- Getachew, G., Makkar, H., & Becker, K. (2002). Tropical browses: contents of phenolic compounds, in vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and in vitro gas production. *The Journal of Agricultural Science*, 139(3), 341-352 .
- Golder, H., & Lean, I. (2024). Invited review: Ruminant acidosis and its definition—A critical review. *Journal of Dairy Science*, 107(12), 10066-10098 .
- González, L., Manteca, X., Calsamiglia, S., Schwartzkopf-Genswein, K., & Ferret, A. (2012). Ruminant acidosis in feedlot cattle: Interplay between feed ingredients, rumen function and feeding behavior (a review). *Animal Feed Science and Technology*, 172(1-2), 66-79 .
- Guo, X., Cheng, L., Liu, J., Zhang, S., Sun, X., & Al-Marashdeh, O. (2019). Effects of licorice extract supplementation on feed intake, digestion, rumen function, blood indices and live weight gain of Karakul sheep. *Animals*, 9(5), 279 .
- Harfoot, C. (1981). Anatomy, physiology and microbiology of the ruminant digestive tract. *Lipid metabolism in ruminant animals*, 1-19 .
- Hasan, M. K., Ara, I., Mondal, M. S. A., & Kabir, Y. (2021). Phytochemistry, pharmacological activity, and potential health benefits of *Glycyrrhiza glabra*. *Heliyon*, 7(6).
- Haliroodi, M., Dayani, O., Sharifi Hosseini, M. M., & Jeshari, M. (2024). The effect of different levels of licorice root powder in the starter diet on performance, skeletal growth indicators and blood cells of Holstein suckling calves. *Journal of Ruminant Research*, 12(4), 109-126.
- Kleen, J., Hooijer, G., Rehage, J., & Noordhuizen, J. (2003). Subacute ruminal acidosis (SARA): a review. *Journal of Veterinary Medicine Series A*, 50(8), 406-414.
- Liang, S., Meng, J., Tang, Z., Xie, X., Tian, M., Ma, X., Yang, X., Xiao, D & Wang, S. (2024). Licorice Extract Supplementation Benefits Growth Performance, Blood Biochemistry and Hormones, Immune Antioxidant Status, Hindgut Fecal Microbial Community, and Metabolism in Beef Cattle. *Veterinary Sciences*, 11(8), 356. <https://www.mdpi.com/2306-7381/11/8/356>
- Liu, J., Ma, B., Hao, G., Su, D., Wang, T., Ding, Z., & Guo, X. (2023). Glycyrrhizin inhibits LPS-induced inflammatory responses in goat ruminal epithelial cells in vitro. *BMC Molecular and Cell Biology*, 24(1), 28 .
- Menke, K. H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., & Schneider, W. (1979). The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. *The Journal of Agricultural Science*, 93, 217 - 222 .
- Menke, K. H., & Steingass, H. (1988). Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. *Anim Res Dev*, 28, 7-55 .
- Moss, A. R., Jouany, J.-P., & Newbold, J. (2000). Methane production by ruminants: its contribution to global warming. *Annales de zootechnie* ,

- Mujawar, N., & Sankpal, P. (2025). New Drug Delivery Mechanism in Combating Livestock Diseases. In *Biofilm Associated Livestock Diseases and their Management* (pp. 189-200). Springer .
- Murray, M. T. (۲۰۲۰). Glycyrrhiza glabra (licorice). *Textbook of natural medicine*, 641 .
- Nagaraja, T., Taylor, M., Harmon, D., & Boyer, J. (1987). In vitro lactic acid inhibition and alterations in volatile fatty acid production by antimicrobial feed additives. *Journal of animal science*, 65(4), 1064-1076 .
- Nikkhah, A., RezaGholivand, A., & Khabbazan, M. (2021). Milk yield depression and its economic loss due to production diseases: Iran's large dairy herds. *Iranian Journal of Veterinary Research*, 22(2), 136 .(In Persian).
- Ottenstein, D., & Bartley, D. (1971). Improved gas chromatography separation of free acids C2-C5 in dilute solution. *Analytical Chemistry*, 43(7), 952-955 .
- Patra, A. K. (2011). Effects of essential oils on rumen fermentation, microbial ecology and ruminant production .
- Patra, A. K., & Yu, Z. (2012). Effects of essential oils on methane production and fermentation by, and abundance and diversity of, rumen microbial populations. *Applied and environmental microbiology*, 78(12), 4271-4280 .
- Phupaboon, S., Muslykhah, U., Suriyapha, C., Sommai, S., Matra, M., Dagaew, G., Prachumchai, R., & Wanapat, M. (2025). Encapsulated phytogenic oils enhance in vitro rumen fermentation and reduce methane emissions. *BMC Veterinary Research*, 21(1), 352.
- Prasad, R., Sourie, S., Cherukuri, V., Fita, L., & Merera, C. (2015). Global warming: Genesis, facts and impacts on livestock farming and mitigation strategies. *Int. J. Agric. Innov. Res*, 3, 2319-1473 .
- Rahchamani, R., Faramarzi, M., Moslemipor, F., & Bayat Kohsar, J. (2019). Effect of supplementing sheep diet with Glycyrrhiza glabra and Urtica dioica powder on growth performance, rumen bacterial community and some blood biochemical constituents. *Iranian Journal of Applied Animal Science*, 9(1), 95-103 .(In Persian).
- Ramos-Morales, E., Rossi, G., Cattin, M., Jones, E., Braganca, R., & Newbold, C. (2018). The effect of an isoflavonid-rich liquorice extract on fermentation, methanogenesis and the microbiome in the rumen simulation technique. *FEMS Microbiology Ecology*, 94(3), fiy009 .
- Reddy, P. R. K., & Hyder, I. (2023). Ruminant digestion. *Textbook of Veterinary Physiology*, 353-366 .
- Reid, J., White, O. D., Anrique, R., & Fortin, A. (1980). Nutritional energetics of livestock: some present boundaries of knowledge and future research needs. *Journal of animal science*, 51(6), 1393-1415 .
- Sejian, V., Bhatta, R., Soren, N., Malik, P., Ravindra, J., Prasad, C. S., & Lal, R. (2015). Introduction to concepts of climate change impact on livestock and its adaptation and mitigation. In *Climate change Impact on livestock: adaptation and mitigation* (pp. 1-23). Springer .
- Shakeri, P., & Forozandeh Shahraki, A. D. (2025). Effects of nano-encapsulated plant promoter on the performance, blood parameters and structural growth of Holstein dairy calves. *Journal of Ruminant Research*, 13(2), 35-48
- Simanungkalit, G., Bhuiyan, M., Bell, R., Sweeting, A., Morton, C. L., Cowley, F., & Hegarty, R. (2023). The effects of antibiotic-free supplementation on the ruminal pH variability and methane emissions of beef cattle under the challenge of subacute ruminal acidosis (SARA). *Research in Veterinary Science*, 160, 30-38 .
- Slyter, L. L. (1976). Influence of acidosis on rumen function. *Journal of animal science*, 43(4), 910-929 .
- Sogut, O., Sezer, U. A., & Sezer, S. (2021). Liposomal delivery systems for herbal extracts. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 61, 102147 .

- Streitenberger, N., Ramiro, R., Navarro, M. A., Asin, J., Henderson, E., Gonzales-Viera, O., Mete, A., Torii, E. H & Uzal, F. A. (2025). Pathology of ruminal acidosis in cattle. *Veterinary Pathology*, 03009858251339889 .
- Swain, P. S., Dominic, G., Bhakthavatsalam, K., & Terhuja, M. (2016). Impact of ruminants on global warming: Indian and global context. In *Climate Change Challenge (3C) and Social-Economic-Ecological Interface-Building: Exploring Potential Adaptation Strategies for Bio-resource Conservation and Livelihood Development* (pp. 83-97). Springer .
- Tagliapietra, F., Cattani, M., Hansen, H. H., Hindrichsen, I. K., Bailoni, L., & Schiavon, S. (2011). Metabolizable energy content of feeds based on 24 or 48 h in situ NDF digestibility and on in vitro 24 h gas production methods. *Animal Feed Science and Technology*, 170(3-4), 182-191 .
- Theodorou, M. K., Williams, B. A., Dhanoa, M. S., McAllan, A. B., & France, J. (1994). A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. *Animal Feed Science and Technology*, 48(3-4), 185-197 .
- Towaje, M. A. A., Kuttar, A. H., Abdulrahman, A., & Salman, M. D. (2020). DIFFERENT RATES OF LICORICE ROOT (GLYCYRRHIZA GLABRA) IN DIETS AND EFFECT IT IN SOME QUALITY OF CARCASS OF LOCAL GOAT MALES .
- Vaghar Seyedin, S. M., Zeidi, A., Chamanepour, E., Nasri, M. H. F., & Vargas-Bello-Pérez, E. (2022). Methane emission: Strategies to reduce global warming in relation to animal husbandry units with emphasis on ruminants. *Sustainability*, 14(24), 16897 .
- Voulgarakis, N., Athanasiou, L., Psalla, D., Gougoulis, D., Papatsiros, V., & Christodouloupoulos, G. (2023). Ruminal acidosis part II: Diagnosis, prevention and treatment. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 74(4), 6329-6336 .
- Voulgarakis, N., Gougoulis, D., Psalla, D., Papakonstantinou, G., Angelidou-Tsifida, M., Papatsiros, V., Athanasiou, L., & Christodouloupoulos, G. (2023). Ruminal Acidosis Part I: Clinical manifestations, epidemiology and impact of the disease. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 74(3), 5883-5891 .