



دانشگاه هنر اسلامی همدان

نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

جلد هشتم، شماره سوم، ۱۳۹۹

<http://ejrr.gau.ac.ir>

۴۵-۶۲

DOI: 10.22069/ejrr.2020.17812.1743

اثر مکمل سازی جیره با سلنیوم و کروم آلی بر کیفیت منی قوچ های نژاد مهریان هنگام نگهداری به صورت مایع در دمای ۴ سانتی گراد

پوریا صارمی شهاب^۱، عباس فرح آور^۲، خلیل زابلی^۲، احمد احمدی^۲ و مرتضی یاوری^۳

^۱دانش آموخته کارشناسی ارشد و ^۲استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بولعلی سینای همدان،

^۳ استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بولعلی سینای همدان

تاریخ دریافت: ۹۹/۱/۴؛ تاریخ پذیرش: ۹۹/۴/۴

چکیده

سابقه و هدف: پژوهش های پیشین نشان داده اند که افزودن ویتامین ها و عناصر معدنی به جیره، قابلیت نگهداری منی حیوانات را هنگام ذخیره سازی سرد به صورت مایع و یا منجمد افزایش می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر افزودن سلنیوم و کروم آلی به جیره غذایی قوچ های نژاد مهریان بر کیفیت منی هنگام نگهداری در دمای ۴ سانتی گراد بود.

مواد و روش ها: در فصل تولید مثالی، تعداد ۱۶ رأس قوچ نژاد مهریان با دامنه سنی ۲ تا ۴ سال و میانگین وزن زنده $۶۹/۷۵ \pm ۱۰/۴۴$ کیلوگرم به چهار گروه چهارتایی تقسیم و با یک جیره پایه که دارای ۷۰ درصد علوفه و ۳۰ درصد کنسانتره بود تغذیه شدند. طرح آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بود. آزمایش به مدت ۶۰ روز به طول انجامید. عامل ها شامل: دو سطح سلنیوم (صفر و ۶۰ میکروگرم سلنیوم به شکل سلنیوم-مخمر در روز به ازای هر راس قوچ)، دو سطح کروم (صفر و ۱۰۰ میکروگرم کروم به شکل کروم-متیونین در روز به ازای هر راس قوچ) و ۴ سطح زمان (صفر، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از ذخیره سازی اسپرم) بودند. کروم به کمک پوکه های کپسول خوراکی و سلنیوم پس از حل کردن در آب مقطر، به کمک مایع خوران به قوچ ها خورانده شد. در سه هفتۀ پایانی آزمایش، از قوچ ها سه بار اسپرم گیری شد. نمونه های منی پس از اسپرم گیری، با رقیق کننده بر پایه تریس-زرده تخمر مرغ رقیق سازی و به درون یخچال با دمای ۴ سانتی گراد منتقل و به مدت ۷۲ ساعت نگهداری شد. درصد زنده مانی، سلامت غشا، ریخت شناسی غیر طبیعی و برخی از فراسنجه های حرکتی اسپرم ها به وسیله سامانه تحلیل گر رایانه ای منی (کاسا) در زمان های صفر، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از ذخیره سازی، تعیین گردید.

یافته ها: اثر کروم، زمان و اثر متقابل آنها و همچنین اثر متقابل سلنیوم × کروم، اثر متقابل سلنیوم × زمان بر زنده مانی و سلامت غشاء اسپرم ها معنی دار بود ($P < 0.05$). اثر سلنیوم و اثر متقابل سلنیوم × زمان بر زنده مانی معنی دار نبود ($P > 0.05$) اما اثر کروم، سلنیوم و زمان و همچنین اثر متقابل آنها بر سلامت غشاء اسپرم ها معنی دار بود ($P < 0.05$). میزان زنده مانی با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافت ($P < 0.05$) و اسپرم قوچ های دریافت کننده جیره حاوی ۱۰۰۰ میکروگرم کروم پس از ۴۸ و ۷۲ ساعت ذخیره سازی در دمای ۴ سانتی گراد، میزان زنده مانی بیشتری نسبت به جیره بدون کروم داشت ($P < 0.05$). همچنین

*نويسنده مسئول: a.farahavar@basu.ac.ir; farahavar@gmail.com

میزان زنده‌مانی اسپرم قوچ‌های دریافت کننده جیره حاوی سلنیوم پس از ۴۸ ساعت ذخیره‌سازی، نسبت به جیره بدون سلنیوم بیشتر بود ($P < 0.05$). افزودن کروم به جیره حاوی سلنیوم باعث افزایش معنی‌دار میزان زنده‌مانی پس از ۴۸ و ۷۲ ساعت ذخیره‌سازی شد ($P < 0.05$). میزان سلامت غشاء با گذشت زمان به طور معنی‌داری کاهش یافت ($P < 0.05$) و میزان سلامت غشاء اسپرم قوچ‌های دریافت کننده جیره حاوی کروم و سلنیوم پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت ذخیره‌سازی در دمای ۴ سانتی‌گراد نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود ($P < 0.05$). اثر کروم، سلنیوم و همچنین اثر متقابل آن‌ها برای فراستجه‌های تعیین شده توسط کاسا معنی‌دار نبود ($P > 0.05$). اثر متقابل سلنیوم و کروم برای ریخت‌شناسی غیرطبیعی معنی‌دار بود ($P < 0.05$) اما اثر کروم، سلنیوم و زمان و اثر متقابل آن‌ها برای این صفت معنی‌دار نبود ($P > 0.05$). میزان جنبایی کل، سرعت در مسیر منحنی، سرعت در مسیر مستقیم، سرعت در مسیر میانگین در طول مدت ذخیره‌سازی اسپرم کاهش یافت ($P < 0.05$) و افزودن کروم و سلنیوم به جیره تغییری در این فراستجه‌ها هنگام ذخیره‌سازی ایجاد نکرد. میزان جنبایی پیشرونده، ریخت‌شناسی غیرطبیعی، معیار مستقیم الخط بودن حرکت تحت تاثیر زمان، سلنیوم و کروم قرار نگرفت ($P > 0.05$).

نتیجه‌گیری: به طور کلی افزودن سلنیوم و کروم آلی به جیره قوچ‌ها منجر به افزایش قابلیت زنده‌مانی و سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم‌ها در طول مدت نگهداری به صورت سرد می‌شود. افزودن کروم و سلنیوم به جیره تغییری در فراستجه‌های تعیین شده توسط کاسا هنگام ذخیره‌سازی مایع منی ایجاد نکرد. بنابراین ممکن است استفاده از سلنیوم و کروم آلی در جیره قوچ‌ها قابلیت نگهداری اسپرم برای تلقیح مصنوعی را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی: اسپرم، سلنیوم، قوچ، کروم

برای به حداقل رساندن بازده تولید مثلی در حیوان نر، تغذیه برخی عناصر کم‌صرف مانند روی، منگنز، کربالت، مس، سلنیوم و کروم ضروری است (۲۴). گزارش شده است که مکمل‌سازی جیره با برخی ویتامین‌ها و عناصر کمیاب، بر سلول‌های اسپرم در هنگام نگهداری به صورت مایع و یا یخ زده اثرات محافظتی دارد (۱۳ و ۱۲). فسفولیپیدهای غشای اسپرم پستانداران، غنی از اسیدهای چرب غیراشبع است و پراکسیداسیون آنها هنگام نگهداری منی به صورت مایع و یا یخ زده افزایش می‌یابد که به‌نوبه خود منجر به کاهش قابلیت زنده‌مانی، یکپارچگی غشایی و در نهایت افت فراستجه‌های حرکتی و باروری اسپرم‌ها می‌شود (۸، ۲). گزارش شده است که افزودن برخی ویتامین‌ها و برخی عناصر معدنی کم‌صرف به جیره، احتمالاً می‌تواند با بهبود توان آنتی‌اکسیدانتی سلول‌های اسپرم، قابلیت نگهداری اسپرم‌ها را پس از انزال به طور مثبت تحت تاثیر قرار دهد (۸ و ۱۳).

مقدمه

امروزه به دلیل توسعه روش‌های نگهداری اسپرم در حیوانات مزرعه‌ای، فرایند تلقیح مصنوعی به طور قابل توجهی گسترش یافته است. اما به دلیل آسیب‌های فراوانی که هنگام نگهداری منی به سلول‌های اسپرم وارد می‌شود، تلقیح مصنوعی با منی نگهداری شده به صورت سرد و یا یخ زده، باعث کاهش نرخ آبستنی می‌شود. به منظور استفاده گسترده‌تر از قابلیت اسپرم سرد و یا منجمد در تلقیح مصنوعی گوسفند، به کارگیری رامبردهای مختلف جهت جلوگیری از وارد آمدن آسیب به سلول اسپرم هنگام نگهداری امری ضروری است. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که کیفیت اسپرم قبل از انزال، تحت تاثیر تغذیه حیوان قرار می‌گیرد؛ همچنین تغذیه تاثیر قابل توجهی بر کیفیت اسپرم پس از نگهداری به صورت سرد و یا منجمد دارد (۱۷).

لیپیدها جلوگیری می‌کند (۷ و ۱۶). از کروم به عنوان یک راهبرد درمانی موثر برای به حداقل رساندن تنش‌های اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع ۲ نیز استفاده می‌شود (۷). سازوکاری که کروم به عنوان آنتی‌اکسیدانت عمل می‌کند هنوز به طور کامل شناخته نشده است؛ اما نتایج تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که افزودن کروم به جیره غذایی باعث کاهش میزان مالون دی‌آلدهید سرم (شاخص پراکسیداسیون لیپید) خون می‌گردد (۷). با وجود این، در خصوص اثرات محافظتی مکمل سازی جیره با کروم و سلنیوم آلی بر سلول‌های اسپرم قوچ در طی فرایند نگهداری سرد مستندات علمی بسیار کمی وجود دارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثرات محافظتی افزودن سلنیوم و کروم آلی به جیره غذایی قوچ‌ها بر ویژگی‌های کیفی اسپرم قوچ هنگام نگهداری به روش سرد در دمای ۴ سانتی‌گراد بود.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال ۱۳۹۶ در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه بوعالی سینای همدان انجام شد. در این آزمایش از تعداد ۱۶ راس قوچ سالم نژاد مهربان، با دامنه سنی ۲ تا ۴ سال و میانگین وزن زنده $69/75 \pm 10/44$ کیلوگرم استفاده شد. قوچ‌ها به صورت تصادفی به چهار گروه چهارتایی تقسیم و با یک جیره پایه که بر اساس توصیه‌های انجمن ملی تحقیقات^۱ (۲۰۰۷) متعادل شده بود تغذیه شدند. جیره غذایی در دو وعده صبح (ساعت ۹:۰۰) و عصر (ساعت ۱۷:۰۰) در اختیار قوچ‌ها قرار می‌گرفت. درصد هر یک از اقلام جیره پایه و همچنین ترکیب شیمیایی آن در جدول ۱ نشان داده شده است.

نشان داده شده است که در بزهای دریافت کننده عناصر روی و مس به عنوان مکمل غذایی، شاخص‌های تنش اکسیداتیو در قبل و پس از انجاماد، در سلول‌های اسپرم کاهش پیدا می‌کند و میزان زنده‌مانی، جنبایی، یکپارچگی غشایی و آکروزمی اسپرم‌ها پس از فرایند انجاماد-یخ‌گشایی بهبود می‌یابد (۲).

سلنیوم ماده معدنی کمیابی است که از طریق بیان طیف گستره‌ای از سلنوپروتئین‌ها، نقش‌های فیزیولوژیکی متنوعی در بدن حیوانات دارد. این عنصر به عنوان کوفاکتور آنزیم‌های مهم آنتی‌اکسیدانتی مانند گلوتاتیون پراکسیداز، نقش مهمی در جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدهای غیراشباع غشای اسپرم در برابر رادیکال‌های آزاد دارد (۸ و ۱۳). کمبود سلنیوم جیره با کاهش کیفیت اسپرم قوچ، گاو نر و خروس در ارتباط است (۱۹ و ۲۱). گزارش شده است که افزودن سلنیوم آلی به جیره غذایی، بر اسپرم خوب و خروس در هنگام نگهداری به صورت سرد اثرات محافظتی دارد (۸ و ۱۳).

عنصر کروم سه ظرفیتی، ماده معدنی ضروری و کم مصرفی است که برای عملکرد طبیعی انسولین و همچنین متابولیسم کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها ضروری است (۲۵). مستندات علمی در مورد تاثیر کروم بر فعالیت‌های تولید مثلی در حیوان نر بسیار اندک است. در یک پژوهش مشخص گردید در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره‌ای حاوی کروم کمتر از ۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم خوراک، تعداد سلول‌های اسپرم ۵۰ درصد و باروری ۲۵ درصد کمتر از موش‌های تغذیه شده با جیره طبیعی (که میزان کروم جیره بالاتر از ۱۰۰ میکروگرم در هر کیلوگرم خوراک بود) است (۱). پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که کروم علاوه بر این که به عنوان یک لیگاند برای گیرنده‌های انسولین عمل می‌کند، دارای خواص آنتی‌اکسیدانتی نیز است و از پراکسیداسیون

جدول ۱- ترکیبات شیمیابی اجزای خوراک و جیره پایه^۱

Table 1. Chemical composition of feed ingredient and basal diet

جیره پایه Basal diet	سبوس گندم Wheat bran	سبوس سویا Soybean meal	کنجاله دانه جو Barely grain	کاه جو Barely Straw	یونجه خشک Alfalfa hay	اجزاء جیره (بر حسب درصد ماده خشک) Feed Ingrediant (as % of Dry Matter)
93.20	89.1	91.00	91.00	95.23	93.1	ماده خشک (درصد) Dry Matter (%)
13.30	16.5	44.00	11.3	4.41	14.5	پروتئین خام (درصد) Crude Protein (%)
2.18	2.50	3.1	3.00	1.5	2.1	انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری بر کیلوگرم) ^۱ Metabolizable Energy (Mcal/Kg) ^۲
32.20	46.00	9.00	20.86	7.75	43.86	الیاف نامحلول در محلول شوینده خشکی (درصد ماده خشک) Neutral Detergent Fiber (% of Dry Matter)
20.31	13.00	6.00	7.00	53.00	32.56	الیاف نامحلول در محلول شوینده اسیدی (درصد ماده خشک). Acid detergent fiber (% of Dry Matter)
2.03	0.05	0.28	0.063	0.06	1.8	کلسیم (درصد) Calcium (%)
0.24	0.24	0.70	0.38	0.07	0.19	فسفر (درصد) Phosphorus (%)
324.3	471.89	74.42	471.92	78.26	492.48	آهن (بی‌بی‌ام) Iron (ppm)
2.65	18.70	16.74	18.82	7.15	20.13	روی (بی‌بی‌ام) Zinc (ppm)
7.09	2.90	2.87	2.8	5.20	15.55	مس (بی‌بی‌ام) Copper (ppm)
0.06						سلنیوم (بی‌بی‌ام) Selenium (ppm)
1.61						کروم (بی‌بی‌ام) Chromium (ppm)

۱- جیره پایه حاوی: یونجه (۴۲ درصد)، کاه جو (۲۸ درصد)، دانه جو (۱۹/۲۰ درصد)، سبوس گندم (۷/۵ درصد)، نمک طعام

۰/۳ درصد) است؛ ۲- انرژی قابل متابولیسم بر اساس مگاکالری بر کیلوگرم ماده خشک است که با استفاده از جداول NRC (۲۰۰۷) برآورد شده است.

1. Basal diet contains: Alfalfa hay (42%), Barely straw (28%), Barely grain (19.20%), Soybean meal (3%), Wheat Bran (7.5%), NaCl (0.3%); 2. Metabolizable energy as Mcal/Kg was estimated by using NRC (2007).

ماده خشک و پروتئین خام اقلام خوراک بر اساس روش انجمن رسمی شیمی دانان کشاورزی (۱۰) و درصد الیاف نامحلول در شوینده خشی و درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی با استفاده از روش و ن سوست تعیین شد (۲۳). انرژی قابل متابولیسم جیره های آزمایشی نیز با استفاده از جداول انجمن ملی تحقیقات (۲۰۰۷) برآورد شد (۱۸). برای اندازه گیری غلظت مواد معدنی موجود در خوراک ها، از روش هضم خشک استفاده شد (۲۶).

در طول آزمایش قوچ ها در یک سالن سر پوشیده و مجهر به قفس های انفرادی به ابعاد ۱×۲ متر با کف سیمانی نگه داری شدند. قبل از ورود قوچ ها به سالن، عملیات شستشو و ضد عفونی شامل شعله افکنی و آهک پاشی انجام شده بود. هر قفس به یک آخور و آب خوری پلاستیکی جهت عرضه آب و خوراک مجهر بود. خوراک و آب تازه به راحتی و به صورت انفرادی در اختیار قوچ ها قرار می گرفت. قبل از شروع آزمایش دوره عادت پذیری به مدت ۱۲ روز و طول دوره آزمایش اصلی ۶۰ روز به طول انجامید. درصد

کمک واژن مصنوعی عادت دهی شدند. پس از آن که قوچ‌ها برای یک دوره تقریبی اسپرماتوزن (که در قوچ حدود ۴۷ روز است) تیمار خوراکی دریافت کردند، از ۴ رأس قوچ در هر تیمار اسپرم‌گیری صورت گرفت. عملیات اسپرم‌گیری از قوچ‌ها ۳ بار (هر هفته یک بار) تکرار شد. مایع منی استحصال شده از قوچ‌ها ابتدا ارزیابی اولیه شد. برای این منظور نمونه‌های با حجم بالاتر از 75 ml/L ، غلظت بیشتر از $2/5 \times 10^9$ در هر میلی لیتر، جنبایی کل بیشتر از درصد و اسپرم‌های غیرطبیعی کمتر از ۱۰ درصد انتخاب شدند. مایع منی استحصال شده از قوچ‌ها ای هر تیماریه نسبت مساوی با هم مخلوط سپس با هر تریس، فروکتوز، اسید سیتریک، زرده تخم مرغ، پنی‌سیلین، استرپتومایسین و آب مقطر (جدول ۲) بود، رقیق شد تا غلظت نهایی اسپرم به 200×10^6 اسپرم در هر میلی لیتر برسد (۵).

در این آزمایش عامل‌ها شامل: دو سطح سلنیوم (صفرا و 600 میکروگرم سلنیوم به شکل سلنیوم-مخمر در روز به ازای هر راس قوچ)، دو سطح کروم (صفرا و 1000 میکروگرم کروم به شکل کروم-متیونین در روز به ازای هر راس قوچ) و ۴ سطح زمان (صفرا، 24 ، 48 و 72 ساعت پس از ذخیره‌سازی اسپرم) بودند. کروم و سلنیوم به صورت روزانه و قبل از وعده غذایی صبح به قوچ‌ها داده می‌شد. مکمل کروم به شکل کروم-متیونین با نام تجاری آویلا کروم- 1000 بود که از شرکت سنا دام پارس تهیه شد. مکمل سلنیوم آلی به شکل مخمر سلنیوم با نام تجاری سلماسکس- 2000 بود که از شرکت بیوریجین برزیل تهیه شد. در این آزمایش مکمل کروم توزین و درون پوکه‌های کپسول خوراکی، به دامها خورانده شد. مکمل سلنیوم نیز پس از توزین و حل کردن در آب مقطر به کمک مایع خوران (درنجر) به قوچ‌ها خورانده شد. قبل از شروع آزمایش، قوچ‌ها برای اسپرم‌گیری به

جدول ۲. ترکیبات رقیق کننده برای نگهداری مایع منی قوچ‌ها در شرایط سرد در دمای 4°C .

Table 2. The basic extender ingredients to store ram semen in chilled condition at 4°C

Amount (in 100 ml)	مقدار (در 100 میلی لیتر)	ترکیبات	Composition
2.71		تریس (گرم)؛ ^۴	Tris (g);
1.00		فروکتوز (گرم)؛ ^۴	Fructose (g);
1.4		اسید سیتریک (گرم)؛ ^۴	Citric Acid (g);
100000		پنی‌سیلین (واحد بین المللی)؛ (IU)	Penicilin (IU);
100000		استرپتومایسین (میکروگرم)؛ (µg)	Streptomycin (µg);
20		زرده تخم مرغ (درصد)؛ (%)	Egg Yolk (%);
اسمولاریته: 320 میلی‌اسمول در لیتر؛ $\text{pH}=7/00$			

Osmolarity: 320 milliosmole per liter $\text{pH}=7.00$

صفرا، 24 ، 48 و 72 ساعت بعد از ذخیره‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر یک از زمان‌های ذکر شده، ابتدا کل نمونه به طور کامل و به آرامی مخلوط شد. سپس بخشی از نمونه منی به درون میکروتیوب منتقل و در آب 35 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه قرار گرفت و سپس فراسنجه‌های کیفی منی ارزیابی شدند.

نمونه‌های منی مربوط به هر گروه تیماری، بعد از رقیق‌سازی در درون ظرف حاوی آب 37°C قرار گرفت و سپس به درون یخچال با دمای 4 درجه سانتی‌گراد منتقل و به مدت 72 ساعت نگهداری شدند. درصد زنده‌مانی اسپرم‌ها، درصد یکپارچگی غشای اسپرم و فراسنجه‌های حرکتی در زمان‌های

میکرولیتر از آن بر روی لام از پیش گرم شده قرار داده شد و با یک لامل (۲۲×۲۲ میلی متر) پوشانده شد. سپس به کمک میکروسکوپ فازکتراست (Labomed LX400 Labo America Inc., Fremont, USA) مجهز به صفحه گرم، فراسنجه‌های حرکتی ارزیابی گردید. جهت بررسی فراسنجه‌های حرکتی اسپرم‌ها، از هر فیلد میکروسکوپی توسط کاسا به مدت دو ثانیه با سرعت ۲۵ فریم در ثانیه فیلمبرداری شد. فراسنجه‌های حرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل جنبایی کل^۱، جنبایی پیشرونده^۲، سرعت در مسیر منحنی^۳، سرعت در مسیر مستقیم^۴، سرعت در مسیر میانگین^۵ و میزان معیار مستقیم الخط بودن حرکت^۶ بودند.

این پژوهش به صورت آزمایش فاكتوریل ۴×۲×۲×۴ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. داده‌های مربوط به صفات مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SAS (نسخه ۹/۴) و رویه GLM تجزیه و تحلیل شد. مدل آماری استفاده شده به صورت ذیل بود:

$$Y_{ijklm} = \mu + B_l + S_{ei} + C_{ri} + T_k + S_{ei}C_{ri} + S_{ei}T_k + C_{ri}T_k + S_{ei}C_{ri}T_k + e_{ijklm}$$

که در مدل آماری فوق مولفه‌ها به ترتیب از چپ به راست شامل میانگین، هفته آزمایش، سطح سلنیوم، سطح کروم، زمان، برهمکنش سلنیوم و کروم، سلنیوم و زمان، کروم و زمان، سلنیوم و کروم و زمان، خطای آزمایشی می‌باشند.

نتایج

نتایج اثر افزودن مکمل‌های کروم و سلنیوم به جیره، بر میزان زنده‌مانی، یکپارچگی غشا و

برای تعیین درصد زنده‌مانی اسپرم و درصد اسپرم-های با ریخت‌شناسی غیرطبیعی، از روش رنگ‌آمیزی ائوزین-نیگروزین استفاده گردید (۵). ارزیابی و شمارش اسپرم‌های رنگ‌آمیزی شده با استفاده از میکروسکوپ نوری (Genus, China) و با بزرگنمایی ۴۰۰× صورت گرفت. در هر لام حداقل ۲۰۰ اسپرم شمارش شد و درصد اسپرم‌های زنده و درصد اسپرم‌های با ریخت‌شناسی غیرطبیعی تعیین شد.

یکپارچگی غشای پلاسمای اسپرم با استفاده از آزمون تورم هایپوسموتیک (تست هاس) ارزیابی شد. محلول هاس شامل ۰/۹ گرم فرکتوز و ۰/۴۹ گرم سیترات سدیم در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب دوبار تقطیر بود (۶). برای این منظور ۱۰ میکرولیتر از منی ذخیره شده به ۵۰۰ میکرولیتر محلول هاس اضافه و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. پس از انکوباسیون، نمونه با ملاتیم مخلوط و یک قطره از آن روی لامی که قبلا در دمای ۳۷°C گرم شده بود قرار گرفت و با لامل پوشانده شد. اسپرم‌های با دم متورم و گره خورده به عنوان اسپرم دارای غشای سالم و اسپرم‌هایی که دم آنها صاف بود به عنوان اسپرم دارای غشای آسیب دیده و ناسالم در نظر گرفته شد. ارزیابی و شمارش اسپرم با استفاده از میکروسکوپ نوری فاز کتراست (Genus, China) و با بزرگنمایی ۴۰۰× صورت گرفت. در هر لام حداقل ۲۰۰ اسپرم شمارش و درصد اسپرم‌های با غشای سالم تعیین شد. به منظور ارزیابی الگوی سینماتیک سلول‌های اسپرم، مانند جنبایی کل اسپرم، جنبایی پیش‌رونده، مسیرهای حرکتی اسپرم و سرعت آن در هر یک از مسیرها از سامانه کامپیوترا ارزیابی اسپرم (کاسا) Sperm VideoTest (St, Petersburg, Russia) (نسخه ۳/۱) استفاده شد. برای این منظور ابتدا ۵۰ میکرولیتر از نمونه اسپرم ذخیره شده با ۹۵۰ میکرولیتر محیط پایه رقیق‌کننده (جدول ۲) رقیق می‌شد (به نسبت ۱ به ۲۰) و پس از ۱۵ دقیقه، ۷

1. Total Motility
2. Progesrative Motility
3. Velocity in Curvilinear Line: VCL
4. Velocity in Straight Line: VSL
5. Velocity in Straight Line: VSL
6. Straightness: STR

صفر × کروم صفر (شاهد) بود ($P < 0.05$). افزودن ۶۰۰ میکروگرم سلنیوم و یا ۱۰۰ میکروگرم کروم به جیره شاهد، میزان زنده‌مانی اسپرم‌ها را ۴۸ ساعت پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش داد ($P < 0.05$). تاثیر کروم بر حفظ قابلیت زنده‌مانی اسپرم‌ها ۴۸ ساعت پس از ذخیره‌سازی بیشتر از سلنیوم بود ($P < 0.05$). استفاده توام سلنیوم و کروم قابلیت زنده‌مانی اسپرم‌ها را ۴۸ ساعت پس از ذخیره‌سازی نسبت به سلنیوم تنها در همین زمان بیشتر حفظ کرد اما تفاوت معنی‌داری با کروم تنها نداشت ($P > 0.05$). پس می‌توان نتیجه گرفت که افزودن ۱۰۰۰ میکروگرم کروم و ۶۰۰ میکروگرم سلنیوم به جیره قوچ‌ها باعث می‌شود تعداد اسپرم‌های کمتری در طی فرایند ذخیره‌سازی سرد بمیرند و بنابراین باعث می‌شود میزان زنده‌مانی اسپرم‌ها ۴۸ ساعت پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد بالاتر از تیمار شاهد باشد.

میزان زنده‌مانی اسپرم‌ها ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در تیمار حاوی سلنیوم تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشت ($P > 0.05$). میزان اسپرم‌های زنده در تیمار حاوی کروم، ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی، بیشتر از سلنیوم بود ($P < 0.05$). استفاده توام سلنیوم و کروم، زنده‌مانی اسپرم‌ها را ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی نسبت به کروم تنها در همین زمان افزایش نداد ($P > 0.05$). بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اگر چه افزودن کروم و سلنیوم به جیره قوچ‌ها باعث می‌شود تعداد اسپرم‌های کمتری در طی فرایند ذخیره‌سازی سرد از بین بروند اما قابلیت زنده‌مانی آنها با گذشت زمان، در تیمار کروم بهتر از تیمار سلنیوم حفظ می‌شود.

ریخت‌شناسی غیر طبیعی اسپرم‌ها و همچنین فراسنجه‌های حرکتی تعیین شده توسط کاسا پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ در جدول ۳ نشان داده شده است.

زنده‌مانی اسپرم‌ها: برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × کروم برای زنده‌مانی اسپرم‌ها معنی‌دار بود ($P < 0.05$). بنابراین اثرات اصلی باهم مقایسه نشد. در مقایسه ترکیب تیماری سطوح مختلف سلنیوم × کروم، کمترین میزان زنده‌مانی مربوط به سلنیوم صفر × کروم صفر (شاهد) بود ($P < 0.05$). افزودن ۱۰۰ میکروگرم سلنیوم و یا ۶۰۰ میکروگرم کروم به جیره شاهد، میزان زنده‌مانی را به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش داد ($P < 0.05$). تاثیر کروم بر حفظ قابلیت زنده‌مانی اسپرم‌ها بیشتر از سلنیوم بود ($P < 0.05$). استفاده توام سلنیوم و کروم قابلیت زنده‌مانی اسپرم‌ها را نسبت به سلنیوم تنها بیشتر حفظ کرد اما تفاوت معنی‌داری با کروم تنها نداشت ($P > 0.05$). پس می‌توان نتیجه گرفت که افزودن کروم و سلنیوم به جیره در این پژوهش در حفظ زنده‌مانی اسپرم‌ها موثر است اما نقش کروم از سلنیوم بیشتر است.

زنده‌مانی اسپرم‌ها با گذشت زمان به‌طور معنی‌داری از زمان صفر تا ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی کاهش یافت ($P < 0.05$). برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × زمان، برای صفت زنده‌مانی معنی‌داری نبود ($P > 0.05$) اما برهم کنش سطوح مختلف کروم × زمان معنی‌دار بود ($P < 0.05$). علاوه بر آن برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × کروم × زمان نیز معنی‌دار بود. بنابراین ترکیب تیماری آنها باهم مقایسه شده است. در مقایسه ترکیب تیماری سطوح مختلف سلنیوم × کروم × زمان، تفاوت معنی‌داری ۲۴ پس از ذخیره‌سازی اسپرم‌ها بین تیمارها وجود نداشت اما در زمان ۴۸، کمترین میزان زنده‌مانی مربوط به سلنیوم

جدول ۳- قابلیت زنده مانی، سلامت غشاء، ریخت‌شناسی غیر طبیعی و فراستنجه های تعیین شده توسط کاسا در اسپرم‌های ذخیره شده در دمای ۴°C.

Table 3. Viability, membrane integrity, abnormal morphology and CASA detected parameters in sperm cells stored at 4°C¹

STR (%)	VAP (µm/s)	VSL (µm/s)	VCL (µm/s)	PM (%)	TM (%)	abMOR (%)	HOST (%)	Viab (%)	عامل‌ها Factors
Selenium (ppm) : سلینیوم (بی‌بی‌ام) :									مشغل
67.45	66.70	46.94	166.71	51.43	91.47	11.73	78.81 ^b	88.32	0
67.85	64.93	38.96	166.68	51.83	90.35	11.78	79.67 ^a	88.66	600
1.30	1.81	3.15	5.45	2.27	0.83	0.03	0.22	0.23	SEM
0.83	0.49	0.07	0.96	0.90	0.34	0.23	0.01	0.30	P Value
Chromium (ppm) : کروم (بی‌بی‌ام) :									مشغل
68.43	65.95	40.15	166.55	53.3	90.97	11.72	78.72 ^b	86.47 ^b	0
66.87	65.67	45.75	166.88	49.95	90.85	11.79	79.76 ^a	90.50 ^a	1000
1.30	1.81	3.15	5.45	2.27	0.83	0.03	0.22	0.38	SEM
0.40	0.91	0.21	0.96	0.30	0.91	0.17	0.01	0.01	P Value
Time (h) : زمان (ساعت) :									مشغل زمان
64.25	77.15 ^a	51.71 ^a	186.22 ^a	49.25	96.04 ^a	11.81	85.72 ^a	95.98 ^a	0
68.87	77.18 ^a	46.45 ^a	172.70 ^{ab}	55.70	93.33 ^a	11.78	81.26 ^b	92.89 ^b	24
68.91	61.44 ^b	40.72 ^{ab}	154.18 ^b	53.08	89.25 ^b	11.73	76.70 ^c	86.39 ^c	48
68.58	53.48 ^c	32.73 ^b	153.79 ^b	48.50	85.04 ^c	11.70	73.28 ^d	78.68 ^d	72
1.85	2.55	4.04	7.71	3.21	1.18	0.04	0.32	0.32	SEM
0.23	0.01	0.03	0.01	0.36	0.05	0.43	0.01	0.01	P Value
Sex×Cr interaction : Se×Cr ترکیب :									مشغل سلینیوم و کروم
68.62	67.21	48.02	166.58	53.87	92.12	11.65 ^b	78.76 ^b	85.93 ^c	Se ₀ ×Cr ₀
66.29	66.18	32.29	166.53	52.75	89.83	11.81 ^a	78.68 ^b	87.01 ^b	Se ₆₀₀ ×Cr ₀
68.25	64.69	45.86	166.94	49.00	90.83	11.80 ^a	78.86 ^b	90.71 ^a	Se ₀ ×Cr ₁₀₀₀
67.45	65.17	45.63	166.83	50.91	90.87	11.77 ^{ab}	80.67 ^a	90.30 ^a	Se ₆₀₀ ×Cr ₁₀₀₀
1.85	2.55	4.40	7.71	3.21	1.18	0.04	0.32	0.53	SEM
0.67	0.76	0.08	0.99	0.63	0.32	0.04	0.01	0.02	P Value
Sex×T interaction : Se×T ترکیب :									مشغل سلینیوم و زمان
64.58	78.22	51.45	188.72	48.50	95.91	11.76	86.03	96.00	Se ₀ ×T ₀
68.25	72.03	52.05	173.10	55.08	93.50	11.73	80.71	92.92	Se ₀ ×T ₂₄
69.33	64.69	48.73	158.64	54.66	90.66	11.70	75.66	85.84	Se ₀ ×T ₄₈
67.66	51.84	35.53	146.79	47.50	85.83	11.72	72.85	78.42	Se ₀ ×T ₇₂
63.91	76.09	51.94	183.74	50.00	96.16	11.86	85.43	95.97	Se ₆₀₀ ×T ₀
69.50	70.32	40.85	172.30	56.33	93.16	11.83	81.81	92.87	Se ₆₀₀ ×T ₂₄
68.50	58.19	32.70	149.90	51.50	87.83	11.76	77.74	86.85	Se ₆₀₀ ×T ₄₈
69.50	55.12	30.32	160.79	49.50	84.25	11.69	73.71	78.94	Se ₆₀₀ ×T ₇₂

ادامه جدول ۳ : Countinued from table 3

ادامه جدول ۳ : Countinued from table 3										ترکیب Cr×T
										Cr×T interaction
										SEM
										P Value
										Cr ₀ ×T ₀
										Cr ₀ ×T ₂₄
										Cr ₀ ×T ₄₈
										Cr ₀ ×T ₇₂
										Cr ₁₀₀₀ ×T ₀
										Cr ₁₀₀₀ ×T ₂₄
										Cr ₁₀₀₀ ×T ₄₈
										Cr ₁₀₀₀ ×T ₇₂
										SEM
										P Value
										ترکیب تیماری
										Se×Cr×T interaction
										Se×Cr×T
										Se ₀ ×Cr ₀ ×T ₀
										Se ₆₀₀ ×Cr ₀ ×T ₀
										Se ₀ ×Cr ₁₀₀₀ ×T ₀
										Se ₆₀₀ ×Cr ₁₀₀₀ ×T ₀
										Se ₀ ×Cr ₀ ×T ₂₄
										Se ₆₀₀ ×Cr ₀ ×T ₂₄
										Se ₀ /Cr ₁₀₀₀ /T ₂₄
										Se ₆₀₀ /Cr ₁₀₀₀ /T ₂₄
										Se ₀ ×Cr ₀ ×T ₄₈
										Se ₆₀₀ ×Cr ₀ ×T ₄₈
										Se ₀ ×Cr ₁₀₀₀ ×T ₄₈
										Se ₆₀₀ ×Cr ₁₀₀₀ ×T ₄₈
										Se ₀ ×Cr ₀ ×T ₇₂
										Se ₆₀₀ ×Cr ₀ ×T ₇₂
										Se ₀ ×Cr ₁₀₀₀ ×T ₇₂
										SEM
										P Value

۱. Viab (زندگانی)، HOST (تست تورم هیپوسموتیک)، abMOR (ریخت شناسی غیرطبیعی)، TM (جنبایی کل)، PM (جنبایی پیشروندۀ)، VCL (سرعت در مسیر منحنی)، VSL (سرعت در مسیر مستقیم)، STR (میزان معیار مستقیم الخط بودن حرکت) و SEM (انحراف استاندارد میانگین‌ها). حروف متفاوت در هر ستون در هر بخش نشان دهنده تفاوت آماری معنی‌دار در سطح ۵ درصد است.

1. Viab (viability), HOST (Hyposmotic soweling test), abMOR (abnormal morphology), Total motility (TM), Progresive motility (PM), Velocity in Curvilinear Line (VCL), Velocity in Straight Line (VSL), Velocity in Average Path (VAP), Straightness (STR), SEM (standard error of means). Different letters in each column and each part show statistically significant difference at 5%.

به سلنیوم ۶۰۰ × کروم ۱۰۰۰ بود ($P<0.05$). افزودن ۶۰۰ میکروگرم سلنیوم تنها و یا ۱۰۰ میکروگرم کروم تنها به جیره شاهد، میزان سلامت غشاء را به طور معنی‌داری نسبت به شاهد تحت تاثیر قرار نداد ($P<0.05$) اما استفاده توأم سلنیوم و کروم میزان

سلامت غشاء اسپرم‌ها: برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × کروم برای سلامت غشاء اسپرم‌ها معنی‌دار بود ($P<0.05$). بنابراین فقط ترکیب تیماری این دو مقایسه شده است. در ترکیب تیماری سطوح مختلف سلنیوم × کروم، بیشترین میزان سلامت غشاء مربوط

آسیب غشایی اسپرم‌ها بطور معنی داری کمتر می‌شود. میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان نداد ($P > 0.05$). بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اگر چه افزودن کروم و سلنیوم به جیره قوچ‌ها باعث می‌شود سلامت غشاء اسپرم‌ها در طی فرایند ذخیره‌سازی افزایش یابد اما کروم و سلنیوم با طولانی‌تر شدن زمان ذخیره‌سازی نمی‌تواند سلامت غشاء اسپرها را حفظ نمایند.

ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها: برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × کروم برای ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها معنی دار بود ($P < 0.05$). بنابراین فقط ترکیب تیماری این دو عامل مقایسه شده است. در ترکیب تیماری سطوح مختلف سلنیوم × کروم، میزان ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها در تیمار سلنیوم صفر × کروم صفر به‌طور معنی داری کمتر از تیمار سلنیوم $600 \times$ کروم صفر و تیمار سلنیوم صفر × کروم 1000 بود ($P < 0.05$). اما استفاده توام سلنیوم و کروم تاثیر معنی داری بر میزان ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها در مقایسه با سایر تیمارها نداشت ($P > 0.05$). پس می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است استفاده از که 1000 میکروگرم کروم و 600 میکروگرم سلنیوم به تنها بی‌در جیره قوچ‌ها بر ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها هنگام ذخیره‌سازی سرد موثر باشد. ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها با گذشت زمان از زمان صفر تا ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی تحت تاثیر زمان قرار نگرفت ($P > 0.05$). علاوه بر آن برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × زمان، همچنین برهم کنش سطوح مختلف کروم × زمان و برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × کروم × زمان برای صفت میزان ریخت‌شناسی غیرطبیعی اسپرم‌ها معنی داری نبود ($P > 0.05$).

سلامت غشاء اسپرم‌ها را نسبت به سایر تیمارها بیشتر حفظ کرد ($P < 0.05$). پس می‌توان نتیجه گرفت که 1000 میکروگرم کروم و 600 میکروگرم سلنیوم به تنها در حفظ سلامت غشاء اسپرم‌ها نقش نداشت اما استفاده توام سلنیوم و کروم میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها را افزایش داد.

میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها با گذشت زمان به‌طور معنی داری از زمان صفر تا ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی کاهش یافت ($P < 0.05$). برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × زمان، برای این صفت معنی داری نبود ($P > 0.05$) اما برهم کنش سطوح مختلف کروم × زمان معنی دار بود ($P < 0.05$). علاوه بر آن برهم کنش سطوح مختلف سلنیوم × کروم × زمان نیز معنی دار بود بنابراین ترکیب تیماری آنها باهم مقایسه شده است. در مقایسه ترکیب تیماری سطوح مختلف سلنیوم × کروم × زمان، میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها 24 پس از ذخیره‌سازی، در تیمار کروم $\times 1000$ سلنیوم 600 بالاتر از سایر تیمارها بود. در زمان 48 ، کمترین میزان سلامت غشاء مربوط به سلنیوم صفر × کروم صفر (شاهد) بود اما افزودن 600 میکروگرم سلنیوم به جیره شاهد، میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها را 48 ساعت پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به‌طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش نداد ($P > 0.05$). تاثیر کروم بر میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها 48 ساعت پس از ذخیره‌سازی در دمای ۴ شاهد بود اما تفاوتی با سلنیوم نداشت ($P > 0.05$). استفاده توام سلنیوم و کروم میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها را 48 ساعت پس از ذخیره‌سازی نسبت به سلنیوم تنها و کروم تنها بیشتر حفظ کرد ($P < 0.05$). پس می‌توان نتیجه گرفت که افزودن کروم به تنها به جیره قوچ‌ها باعث می‌شود آسیب غشایی اسپرم‌ها با گذشت زمان طی فرایند ذخیره‌سازی سرد کاهش یابد اما زمانی که همراه با سلنیوم استفاده می‌شود

${}^{\circ}\text{C}$ مستندات علمی یافت نشد. در یک مطالعه، افزودن ۰/۰ پی‌پی ام سلینیوم به جیره گاوهای نر برانگوس به مدت ۶۰ روز، بر فراسنجه‌های اسپرم تازه اanzال شده و یخگشایی شده پس از انجماد، موثر نبود (۲۱). در مطالعه دیگری افزودن ۰/۵ پی‌پی ام سلینیوم آلى از نوع سلینیوم مخمر، باعث افزایش سطح گلوتاتیون سلول‌های اسپرم خوک نر شد اما درصد زنده‌مانی اسپرم‌های ذخیره شده در دمای ۱۵ درجه‌سانی گراد را پس از ۷۲ ساعت بهبود نداد (۱۳) که با نتایج این پژوهش مغایرت داشت. علت این مغایرت ممکن است به نوع گونه حیوانی و دمای نگهداری اسپرم مربوط شود. تغذیه بوقلمون‌های نر با سلینیوم آلى و نگهداری اسپرم آنها در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ ، میزان جنبایی سلول‌های اسپرم‌ها را پس از نگهداری افزایش داد (۸). در پژوهش دیگری نیز افزودن نانوذرات سلینیوم به جیره خروس‌های نژاد لگهورن، خصوصیات کیفی مایع منی را بهبود بخشید و آسیب‌های اکسیداتیو را کاهش داد (۱۹). افزودن سلینیوم به جیره خرگوش در سطحی بالاتر از احتیاجات، باعث افزایش غلظت گلوتاتیون پراکسیداز در گلبول قرمز، سلول‌های اسپرم و پلاسمای منی شد اما، هنگامی که اسپرم‌های تیمار دریافت کننده سلینیوم برای مدت ۲۴ ساعت در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ نگهداری شد، درصد زنده‌مانی اسپرم‌ها پس از ۲۴ ساعت نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری نشان نداد (۶) و با نتایج پژوهش حاضر مغایر بود.

برای توضیح علل نتایج متناقض در پژوهش‌های مختلف، چندین فاکتور را می‌توان در نظر گرفت. در ابتدا مهم‌ترین عامل تاثیرگذار را می‌توان میزان نیاز بدن به سلینیوم دانست. مطالعاتی که اثرات مشتبی بر زنده‌مانی، مرفلوژی، میزان جنبایی اسپرم، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و قابلیت باروری گزارش کرده‌اند عمده‌تاً در حیواناتی بود که دارای کمبود سلینیوم

فراسنجه‌های حرکتی تعیین شده توسط کاسا: در بررسی فراسنجه‌های حرکتی تعیین شده توسط کاسا، مشخص گردید که میزان جنبایی کل، سرعت در مسیر منحنی، سرعت در مسیر مستقیم و سرعت در مسیر میانگین با گذشت زمان به‌طور معنی‌داری از زمان صفر تا ۷۲ ساعت پس از ذخیره‌سازی کاهش می‌یابد ($P<0.05$) اما جنبایی پیشرونده و میزان معیار مستقیم الخط بودن حرکت تحت زمان قرار نگرفت. اثر مستقل سطوح مختلف سلینیوم و کروم برای فراسنجه‌های مذکور معنی‌دار نبود ($P>0.05$).

بحث

سلینیوم از طریق بیان طیف گستردگی از سلنیپروتئین‌ها، نقش‌های متنوع فیزیولوژیک در بدن حیوانات دارد. این عنصر به عنوان کوفاکتور آنزیم‌های مهم آنتی‌اکسیدانتی، مانند گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهمی در جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدهای غیراشبع غشاء اسپرم در برابر رادیکال‌های آزاد دارد (۱۳ و ۸). کمبود تغذیه‌ای سلینیوم و یا اختلال در جذب آن از دستگاه گوارش، موجب کاهش توان آنتی‌اکسیدانتی در مایع منی و سلول‌های اسپرم می‌شود که علاوه بر کاهش کیفیت مایع منی تازه اanzال شده، ممکن است قابلیت آن را برای نگهداری (سرد یا منجمد) کاهش دهد. بنابراین غشاء این نوع اسپرم‌ها طی فرایند نگهداری زودتر آسیب دیده و جنبایی اسپرم و نقص‌های مرفلوژیکی افزایش یافته و باوری آن پس از تلقیح کاهش می‌یابد (۸ و ۲۱). در بررسی پژوهش‌های پیشین، در مورد اثر مکمل‌سازی جیره با سلینیوم و کروم آلى بر خصوصیات کیفی سلول‌های اسپرم قوچ پس از نگهداری سرد در دمای

۷۵۰ بیجی ام کروم پیکولینات به جیره بوقلمون های نر، غلظت، جنبایی، زنده مانی و باروری اسپرم ها را به طور معنی داری افزایش داد. در حالی که حجم انزال تحت تاثیر قرار نگرفت (۳). گزارش شده است که افزودن کروم به جیره قوچ ها میزان ناهنجاری اسپرم های تازه انزال شده را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش می دهد (۱۴). در پژوهش حاضر نشان داده شد که افزودن ۱۰۰۰ میکرو گرم کروم به جیره غذایی قوچ ها به طور معنی داری باعث افزایش درصد زنده مانی اسپرم ها ۷۲ ساعت پس از نگهداری در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۴ نسبت به سطح صفر کروم می شود.

پژوهش های پیشین نشان داده اند که کروم علاوه بر اینکه به عنوان یک لیگاند برای رستورهای انسولین عمل می کند دارای خواص آنتی اکسیدانتی نیز است و از پراکسیداسیون لیپیدها جلوگیری می کند (۷ و ۱۶). از کروم به عنوان یک استراتژی درمانی موثر برای به حداقل رساندن تنفس های اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع ۲ استفاده می شود (۷). مکانیسمی که کروم به عنوان آنتی اکسیدانت عمل می کند. هنوز به طور کامل شناخته نشده است. با این وجود نتایج تحقیقات مختلف نشان داده اند که افزودن کروم به جیره غذایی باعث کاهش میزان مالون دی آلدهید سرم (شانکس پراکسیداسیون لیپید) خون می گردد (۷). گزارش شده است که مصرف مکمل کروم در قوچ ها به طور معنی داری باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهید در پلاسمما خون نسبت به تیمار شاهد می شود (۱۴). نشان داده شده است که اختلال در عملکرد انسولین باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدها می شود، احتمالاً کروم اثر آنتی اکسیدانتی خود را از طریق تنظیم عملکرد انسولین اعمال می کند (۷).

در مطالعه ای نشان داده شد که غلظت پلاسمایی گلوکز در قوچ های تغذیه شده با کروم، ۱۵ دقیقه پس

بوده اند. در برخی مطالعات، با وجود عدم کمبود سلنیوم در حیوان، بهبود کیفیت مایع منی گزارش شده است. به عنوان مثال افزودن سلنیوم به جیره قوچ هایی که جیره پایه آن ها کمبود سلنیوم نداشت موجب بهبود کیفیت مایع منی شد (۱۲). نتایج مشابهی نیز در خروس گزارش شده است (۲۰). مطالعات مختلف علت آن را تقاضوت گونه ای در متابولیسم سلنیوم پیشنهاد کرده اند (۱۲ و ۴). با وجود کمبود مستندات علمی، پیشنهاد شده است که نیاز برخی گونه های حیوانی مانند خرگوش به سلنیوم، کم بوده (۴) و نیاز برخی گونه های مانند قوچ بالا (۱۲) است. بر این اساس ممکن است افزودن سلنیوم به جیره قوچ ها بتواند اثرات منفی کمبودهای حاشیه ای سلنیوم بر کیفیت منی و قابلیت آن برای ذخیره سازی را کاهش دهد. بنابراین بهبود زنده مانی اسپرم ها در این پژوهش را می توان به اثر مثبت افزودن سلنیوم آلی به جیره قوچ ها ارتباط داد.

سازوکار اثر کروم بر تولید مثل به طور واضح مشخص نیست. گزارش شده است که کروم می تواند به واسطه تغییر در حساسیت سلول های هدف نسبت به هورمون انسولین، سامانه تولید مثلی را تحت تاثیر قرار دهد (۲۲). اکثر پژوهش های انجام شده در مورد کروم، بیشتر بر تولید مثل در جنس ماده مرمرکز بوده است. مستندات علمی در رابطه با اثر کروم بر تولید مثل در گاو نر، قوچ و بز موجود نیست. گزارش شده است که مکمل سازی جیره موش های نر با کروم منجر به افزایش تعداد اسپرم و همچنین افزایش در میزان باروری می گردد (۱). در پژوهشی در خوک نشان داده شد که افزودن کروم پیکولینات به جیره خوک نر تاثیری بر غلظت اسپرم و جنبایی آن ندارد، اما باعث کاهش حجم انزال می شود و کروم ممکن است اثر مثبت خود را به صورت کاهش تعداد اسپرم های غیر نرمال نشان دهد (۱۱). در پژوهش دیگری افزودن

افزایش خطی انسولین و تری‌گلیسرید پلاسمای خون گردید اما غلظت گلوکز، کورتیزول، هورمون‌های تیروئیدی تحت تاثیر قرار نگرفت (۹). در مطالعه دیگری نیز گزارش شده است که مکمل‌سازی جیره میش‌ها با کروم-متیونین و سلنیوم-متیونین موجب کاهش معنی‌داری در غلظت مالون دی‌آلدهید پلاسمای خون میش‌ها می‌شود (۱۵). بهر حال استفاده توام کروم و سلنیوم دارای اثرات ناشناخته بر تولیدمثل حیوان نر است که نیازمند تحقیقات بیشتر است.

نتیجه‌گیری کلی

افزودن کروم و سلنیوم به جیره قوچ‌ها باعث شد تعداد اسپرم‌های کمتری در طی فرایند ذخیره‌سازی سرد از بین برونده و سلامت غشاء آنها بیشتر حفظ شود اما فراسنجه‌های حرکتی تعیین شده توسط کاسا تحت تاثیر قرار نگرفت. همچنین قابلیت زنده‌مانی اسپرم‌ها با گذشت زمان، در تیمار کروم بهتر از تیمار سلنیوم حفظ شد. استفاده توام سلنیوم و کروم میزان سلامت غشاء اسپرم‌ها را نسبت به استفاده تنها از کروم و سلنیوم افزایش داد و اثر متقابل هم‌افزایی مثبتی بین سلنیوم و کروم برای حفظ سلامت غشاء در طول مدت نگهداری منی وجود دارد. به‌طور کلی ممکن است استفاده از سلنیوم و کروم آلی در جیره قوچ‌ها قابلیت نگهداری اسپرم برای تلقیح مصنوعی را افزایش دهد.

تعارض منافع: هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان وجود ندارد.

منابع

- Anderson, R.A. and Polansky, M.M. 1981. Dietary chromium deficiency effect on sperm count and fertility in rats. *Biological Trace Element Research*. 3(1):1-5.

از تزریق درون رگی گلوکز، کمتر از تیمار شاهد است که نشان دهنده بهبود متابولیسم گلوکز توسط مکمل کروم است (۱۴). ممکن است مکانیسم تاثیر کروم بر کیفیت اسپرم را به توان این‌گونه توجیه کرد که، کمبود کروم از طریق اختلال در عملکرد انسولین باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدها می‌گردد و کیفیت مایع منی انزالی را برای نگهداری کاهش می‌دهد اما زمانی که حیوان کمبود کروم نداشته باشد، احتمالاً اختلالی در میزان تولید اسپرم و کیفیت آن مشاهده نمی‌شود. در این پژوهش ممکن است مکمل کروم از طریق بهبود عملکرد انسولین، اثرات مثبت خود را بر کیفیت اسپرم‌های تولید شده اعمال کرده است.

در این پژوهش استفاده توأم کروم و سلنیوم در جیره قوچ‌ها نسبت به استفاده سلنیوم و کروم به تنهایی، تاثیر معنی‌داری بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم پس از ذخیره سازی آن در دمای ۴ درجه سانتیگراد نداشت. در مورد استفاده توام سلنیوم و کروم بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم مستندات علمی بسیار کمی وجود دارد. همچنین در مورد تاثیر استفاده توأم سلنیوم و کروم در جیره قوچ، بر قابلیت نگهداری مایع منی در شرایط سرد مستندات علمی یافت نشد. نشان داده شده است که افزودن توأم سلنیوم و کروم به جیره قوچ‌های نژاد مهریان تاثیر مثبتی بر برخی فراسنجه‌های کیفی اسپرم بلافضله پس از انزال دارد (۱۴). در آزمایشی نشان داده شد که در برده‌های در حال رشد نژاد رامبویه، با افزودن کروم به جیره حاوی سلنیوم (سطوح صفر و $\frac{1}{3}$ پی‌پی ام سلنیوم به شکل سلنیوم مخمر)، سبب کاهش خطی اوره و

- Arangasamy, A., Krishnaiah, M.V., Manohar, N., Selvaraju, S., Rani, G.P., Soren, N.M., Reddy, I.J. and Ravindra, J.P. 2018. Cryoprotective role of organic Zn and Cu supplementation in goats (*Capra hircus*) diet. *Cryobiology*. 81:117-24.

3. Biswas, A., Divya, S., Mandal, A.B., Majumdar, S. and Singh, R. 2014. Effects of dietary supplementation of organic chromium (picolinate) on physical and biochemical characteristics of semen and carcass traits of male turkeys. *Animal Reproduction Science*. 151(3-4):237-43.
4. Blas, C. and Wiseman, J., editors. 2010. *Nutrition of the Rabbit*. CABI.
5. Bucak, M.N., Bodu, M., Başpinar, N., Güngör, Ş., İli, P., Acibaeva, B., Toprakkaleh, T.R. and Dursun, Ş. 2019. Influence of Ellagic Acid and Ebselen on sperm and oxidative stress parameters during liquid preservation of ram semen. *Cell Journal (Yakhtheh)*. 12(1):7-13.
6. Castellini, C., Lattaioli, P., Dal Bosco, A. and Beghelli, D. 2002. Effect of supranutritional level of dietary α-tocopherol acetate and selenium on rabbit semen. *Theriogenology*. 58(9):1723-32.
7. Cheng, H.H., Lai, M.H., Hou, W.C. and Huang, C.L. 2004. Antioxidant effects of chromium supplementation with type 2 diabetes mellitus and euglycemic subjects. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 52(5):1385-9.
8. Dimitrov, S.G., Atanasov, V.K., Surai, P.F. and Denev, S.A. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. *Animal Reproduction Science*. 100(3-4):311-7.
9. Domínguez-Vara, I.A., González-Muñoz, S.S., Pinos-Rodríguez, J.M., Bórquez-Gastelum, J.L., Bárcena-Gama, R., Mendoza-Martínez, G., Zapata, L.E. and Landois-Palencia, L.L. 2009. Effects of feeding selenium-yeast and chromium-yeast to finishing lambs on growth, carcass characteristics, and blood hormones and metabolites. *Journal of Animal Feed Science and Technology*. 152(1-2):42-9.
10. Helrich, K. 1990. Official methods of analysis of the AOAC International. Association of Official Analytical Chemists.
11. Horký, P., Jančíková, P. and Zeman, L. 2013. The effect of a supplement of chromium (picolinate) on the level of blood glucose, insulin activity and changes in laboratory evaluation of the ejaculate of breeding boars. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*. 60(1):49-56.
12. Kendall, N.R., McMullen, S., Green, A. and Rodway, R.G. 2000. The effect of a zinc, cobalt and selenium soluble glass bolus on trace element status and semen quality of ram lambs. *Animal Reproduction Science*. 62(4):277-83.
13. Martins SM, De Andrade AF, Zaffalon FG, Bressan FF, Pugine SM, Melo MP, Chiaratti MR, Marino CT, Moretti AS, Arruda RP. 2015. Organic selenium supplementation increases PHGPx but does not improve viability in chilled boar semen. *Andrologia*. 47(1):85-90.
14. Mehranfrooz, A.H., Farahavar, A., Ahmadi, A. and Yavari, M. 2018. Effect of selenium and chromium supplementation on semen characteristics, glucose metabolism and some blood parameters in Mehraban rams. Bu-Ali Sina University. MSc Thesis.
15. Mousaie, A., Valizadeh, R., Naserian, A.A., Heidarpour, M. and Mehrjerdi, H.K. 2014. Impacts of feeding selenium-methionine and chromium-methionine on performance, serum components, antioxidant status, and physiological responses to transportation stress of Baluchi ewe lambs. *Biological Trace Element Research*. 162(1-3):113-23.
16. Onderci, M., Sahin, N., Sahin, K. and Kilic, N. 2003. Antioxidant properties of chromium and zinc. *Biological trace element research*. 92(2):139-49.
17. Ramachandran, N., Singh, N.P., Ranjan, R., Singh, M.K., Shinde, A.K. 2016. Assessment of rearing systems and seasons on nutrient intake and semen freezability in Jamunapari bucks. *Indian Journal of Animal Science*. 86:1259-62.
18. National Research Council (US). 2007. Committee on Nutrient Requirements of Small Ruminants, Board on Agriculture, Division on Earth, Life Studies. *Nutrient Requirements of small Ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids*.

- 19.Safa, S., Moghaddam, G., Jozani, R.J. and Daghighe Kia, H. 2016. Janmohammadi H. Effect of vitamin E and selenium nanoparticles on post-thaw variables and oxidative status of rooster semen. *Animal Reproduction Science.* 174:100-6.
- 20.Surai, P., Kostjuk, I., Wishart, G., Macpherson, A., Speake, B., Noble, R., Ionov, I. and Kutz, E. 1998. Effect of vitamin E and selenium supplementation of cockerel diets on glutathione peroxidase activity and lipid peroxidation susceptibility in sperm, testes, and liver. *Biological Trace Element Research.* 64(1-3):119-32.
- 21.Tsuneda, P.P., Tsuneda, B.H., Hatamoto-Zervoudakis, L.K., Zervoudakis, J.T., Marinho, W.A., Júnior, D., Ferreira, M., Araújo, E.B., Motheo, T.F. and Silva, L.E. 2019. Suplementação de selênio na dieta e qualidade espermática do sêmen de touros brangus. *Ciência Animal Brasileira.* 20.
- 22.Tuormaa, T.E. 2000. Chromium, selenium and copper and other trace minerals in health and reproduction. *Journal of Orthomolecular Medicine.* 15(3):145-56.
- 23.Van Soest, P.V., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science.* 74(10):3583-97.
- 24.Vázquez-Armijo, J.F., Rojo, R., López, D., Tinoco, J.L., González, A., Pescador, N. and Domínguez-Vara, I.A. 2011. Trace elements in sheep and goats reproduction: A review. *Tropical and Subtropical Agroecosystems.* 14(1):1-3.
- 25.Vincent, J. 2018. The nutritional biochemistry of chromium (III). Elsevier.
- 26.Zhang, W., Wang, R., Kleemann, D.O., Lu, D., Zhu, X., Zhang, C. and Jia, Z. 2008. Effects of dietary copper on nutrient digestibility, growth performance and plasma copper status in cashmere goats. *Small Ruminant Research.* 74(1-3): 188-193.



The effect of dietary supplementation of organic selenium and chromium on Mehraban ram semen quality during liquid storage at 4°C

P. Saremi shahab¹, *A. Farahavar², K. Zaboli², A. Ahmadi² and M. Yavari³

¹M.Sc. Graduated, ²Assistant Prof., Dept. of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, ³Assistant Prof., Dept. of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Received: 03/23/2020; Accepted: 06/24/2020

Abstract

Background and objective: Some previous researches have shown that dietary supplementation with some vitamins and trace elements can increase the ability of animals semen preservation during liquid storage or freezing. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of dietary supplementation of organic selenium and chromium on ram semen quality during liquid storage at 4°C.

Material and methods: Numbers of 16 Mehraban rams, with ages ranging from 2-4 years and 69.75 ± 10.44 kg average body weight, were divided into four groups of four and were fed by a basal diet consist of 70% forage and 30% concentrate. The experimental design was $2 \times 2 \times 4$ factorial experiment based on randomized complete block design. The experiment lasted for 60 days. In this experiment, three factors were including selenium at two levels (0 and 600 $\mu\text{g}/\text{day}/\text{ram}$ selenium as yeast-selenium), chromium at 2 levels (0 and 1000 $\mu\text{g}/\text{day}/\text{ram}$ chromium as chromium-methionin) and time at 4 levels (0, 24, 48 and 72 hours after storage). Chromium was fed to rams using edible capsule shells and also selenium by drencher after dissolving in distilled water. In the last three weeks of the experiment, semen samples were collected three times. Semen samples after collection was diluted with tirs-egg yolk base extender and stored at 4°C for 72 h. Sperm cells viability, membrane integrity, abnormal morphology, total motility and progressive motility and some motion parameters is detected by computer-assisted sperm analysis at 0, 24, 48, and 72 hours after storage.

Results: The effects of chromium, time and their interaction and also selenium \times chromium interaction, selenium \times chromium \times time interaction were significant for sperm viability and membrane integrity ($P < 0.05$). The effect of selenium and selenium \times chromium interaction was not significant for viability ($P > 0.05$) but, the effect of chromium, selenium and time and also their interaction for membrane integrity was significant ($P < 0.05$). The viability reduced over time significantly ($P < 0.05$) and sperm viability in rams receiving the diet contained 1000 μg chromium, was higher than diet without chromium after storage at 4°C for 48 and 72 hours ($P < 0.05$). In addition, sperm viability in rams receiving the diet contained 600 μg selenium was higher than diet without selenium after storage at 4°C for 48 hours ($P < 0.05$). Adding 1000 μg chromium to diet containing 600 μg selenium, increased significantly sperm viability after storage at 4°C for 48 and 72 hours ($P < 0.05$). The membrane integrity reduced over time significantly ($P < 0.05$) and sperm membrane integrity in rams receiving the diet contained 1000 μg chromium was higher than other groups after storage at 4°C for 24 and 48 hours ($P < 0.05$). The effect of selenium and chromium and also their interaction was not significant for computer detected parameters ($P < 0.05$). Interaction of selenium and chromium for abnormal morphology was significant ($P < 0.05$) but the effects of chromium, selenium, time and their interaction was not significant ($P > 0.05$). Total motility, velocity in curvilinear line, velocity in straight line,

*Corresponding author; a.farahavar@basu.ac.ir; farahavar@gmail.com

velocity in average path decreased over time during semen storage at 4°C ($P<0.05$) and diet supplementation of selenium and chromium did not change these parameters ($P>0.05$). Progressive motility, abnormal morphology and straightness did not affected by time, selenium and chromium.

Conclusion: Generally, dietary supplementation of organic selenium and chromium in rams leads to increased sperm viability and membrane integrity during chilled liquid storage. Dietary supplementation of selenium and chromium did not change computer detected parameters during semen storage at 4°C. In general, the use of organic selenium and chromium in the diet of rams may increase the ability of sperm storage for artificial insemination.

Keywords: Chromium, Ram, Selenium, Sperm

